

Thuốc dostinex điều trị vô sinh ở phụ nữ cao prolactin

Bởi **admin** - 20/12/2017



Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ - Thuốc đặc trị 247

Thuốc **Dostinex 0.5 Cabergoline** là 1 chất dẫn xuất từ nấm cựa gà (ergot de seigle) và là chất đồng vận (agonist) khá chọn lọc thụ thể dopamine D2, chất ức chế mạnh tiết prolactin từ tuyến đồi (hypophyse). Ngoài chỉ định dùng điều trị bệnh Parkinson, cabergoline còn dùng để điều trị chứng cao prolactin huyết (hyperprolactinemia).



Bạn cần biết giá thuốc **Dostinex 0.5 Cabergoline** bao nhiêu? Bạn chưa biết thuốc **Cabergoline** bán ở đâu? **Thuocdactri247** là địa chỉ chuyên mua bán thuốc **Dostinex 0.5 Cabergoline** tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ... Toàn Quốc.

Nội Dung Bài Viết



1. Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline là gì?
2. Thông tin cơ bản thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline
3. Chỉ định điều trị thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline
 - 3.1. Ức chế tiết sữa sinh lý:
 - 3.2. Điều trị rối loạn tăng prolactinaemia:
4. Chống chỉ định điều trị thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline
5. Cơ chế tác động điều trị của thuốc dostinex
6. Cách sử dụng thuốc Dostinex như thế nào?
7. Lưu ý trước khi dùng thuốc Dostinex
8. Nên dùng thuốc Cabergoline (Dostinex) như thế nào?
9. Điều gì xảy ra nếu dùng quá liều?
10. Tôi nên tránh những gì khi dùng Dostinex?
11. Cách điều trị với thuốc dostinex
 - 11.1. Đối với liều uống:
 - 11.2. Đối với liều đặt âm đạo:
12. Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Cabergoline (Dostinex)?
13. Tác dụng phụ của thuốc Dostinex
 - 13.1. Các tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm:
14. Ảnh hưởng của thuốc Dostinex đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
15. Ảnh hưởng của thuốc Dostinex đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
16. Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 16.1. Like this:
 - 16.2. Có liên quan



Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline là gì?

Thuốc Cabergoline là một chất chủ vận thụ thể dopamine. Thuốc hoạt động bằng cách giảm lượng prolactin (một loại hormone) được giải phóng từ tuyến yên.


Thuốc Cabergoline được sử dụng để điều trị mất cân bằng hormone trong đó có quá nhiều prolactin trong máu (còn được gọi là hyperprolactinemia).

Thông tin cơ bản thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline

- Tên thương hiệu: **Dostinex**
- Thành phần hoạt chất: **Cabergoline**
- Hãng sản xuất: Bayer
- Hàm lượng: 0.5mg
- Dạng: Dung dịch
- Đóng gói: Hộp 8 ống

Giá thuốc dostinex: Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**





Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chỉ định điều trị thuốc **Dostinex 0.5mg** **Cabergoline**

Ức chế tiết sữa sinh lý:

Thuốc Cabergoline được chỉ định để ức chế tiết sữa sinh lý ngay sau khi sinh và để ức chế tiết sữa đã được thiết lập:

- Sau khi sinh, mẹ bầu không cho con bú hoặc khi cho con bú bị chống chỉ định vì lý do y tế liên quan đến mẹ hoặc con mới sinh.
- Sau khi chết non hoặc phá thai.



Thuốc Cabergoline ngăn ngừa, ức chế tiết sữa sinh lý bằng cách ức chế bài tiết prolactin.

Trong các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát, thuốc Cabergoline được dùng dưới dạng 1mg duy nhất trong ngày đầu tiên sau sinh, có hiệu quả trong việc ức chế tiết sữa, cũng như căng vú và đau ở 70 – 90% phụ nữ. Ít hơn 5% phụ nữ trải qua triệu chứng vú hồi phục trong tuần thứ ba sau sinh (thường nhẹ ở mức độ nghiêm trọng).

Ức chế bài tiết sữa và giảm đau vú và đau ở khoảng 85% phụ nữ cho con bú được điều trị với tổng liều 1mg thuốc Cabergoline được chia thành bốn lần chia trong hai ngày. Triệu chứng vú hồi phục sau ngày thứ 10 là không phổ biến (khoảng 2% trường hợp).

Điều trị rối loạn tăng prolactinaemia:

- Thuốc Cabergoline được chỉ định để điều trị các rối loạn chức năng liên quan đến tăng prolactinaemia, bao gồm vô kinh, oligomenorrhoea, anovulation và galactorrhoea.
- Thuốc Cabergoline được chỉ định ở những bệnh nhân bị u tuyến yên tiết prolactin (micro- và macroprolactinomas), tăng prolactinaemia vô căn, hoặc hội chứng sella rỗng với tăng prolactinaemia liên quan.
- Trong liệu pháp mãn tính, thuốc Cabergoline với liều từ 1 đến 2mg mỗi tuần, có hiệu quả trong việc bình thường hóa nồng độ prolactin huyết thanh ở khoảng 84% bệnh nhân tăng prolactinaemia.



Chống chỉ định điều trị thuốc Dostinex 0.5mg

Cabergoline

- Quá mẫn cảm với thuốc Cabergoline, bất kỳ tá dược nào hoặc bất kỳ alcaloid ergot nào.
- Tiền sử rối loạn chức năng phổi, màng ngoài tim và sau phúc mạc.
- Thuốc Cabergoline chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan và nhiễm độc máu khi mang thai.
- Thuốc Cabergoline không nên được dùng cùng với thuốc chống loạn thần hoặc dùng cho phụ nữ có tiền sử rối loạn tâm thần.
- Đối với điều trị lâu dài: Bằng chứng về bệnh van tim được xác định bằng siêu âm tim trước điều trị.

Cơ chế tác động điều trị của thuốc dostinex

Thuốc Dostinex được điều chế từ chất dẫn xuất nấm cựa gà. Dẫn xuất cabergoline được gọi là chất đồng vận khác chọn lọc thụ thể Dopamine D2, có tác dụng hiệu quả trong việc ức chế tuyến yên đồi.

Thuốc có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân cao prolactin hoặc do u tuyến yên. Từ đó điều trị tình trạng vô sinh ở phụ nữ hiệu quả. Là giải pháp an toàn cho chị em điều trị mà không cần phẫu thuật cắt tuyến yên.



Cách sử dụng thuốc Dostinex như thế nào?

- Dùng thuốc Dostinex bằng miệng có hoặc không có thức ăn, thường là hai lần một tuần hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- Liều lượng được dựa trên tình trạng của bạn và đáp ứng với điều trị (mức độ prolactin). Bác sĩ sẽ bắt đầu với liều thấp và từ từ tăng liều trong vài tháng để giúp giảm tác dụng phụ. Làm theo hướng dẫn của bác sĩ một cách cẩn thận.
- Dùng thuốc Dostinex thường xuyên để có được lợi ích cao nhất từ nó. Để giúp bạn nhớ, đánh dấu những ngày trên lịch khi bạn cần dùng thuốc.

Lưu ý trước khi dùng thuốc Dostinex

Bạn không nên sử dụng Dostinex nếu bạn bị dị ứng với nó, hoặc nếu bạn có:

- Huyết áp cao không kiểm soát được (tăng huyết áp)
- Rối loạn van tim
- Sự phát triển của các mô dư thừa (xơ hóa) trong phổi hoặc xung quanh tim hoặc dạ dày của bạn
- Dị ứng với bất kỳ loại thuốc ergot nào, chẳng hạn như dihydroergotamine , ergotamine, ergonovine hoặc methylergonovine .

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có:

- Bệnh gan
- Vấn đề tim mạch
- Tăng huyết áp do mang thai, bao gồm sản giật và tiền sản giật



Người ta không biết liệu thuốc Dostinex sẽ gây hại cho thai nhi. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn có thai.

Bạn không nên cho con bú trong khi sử dụng thuốc Dostinex.

Nên dùng thuốc Cabergoline (Dostinex) như thế nào?

- Bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm để đảm bảo bạn không có điều kiện ngăn bạn sử dụng thuốc Dostinex một cách an toàn.
- Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn và đọc tất cả các hướng dẫn thuốc hoặc tờ hướng dẫn. Bác sĩ của bạn đôi khi có thể thay đổi liều của bạn. Sử dụng thuốc chính xác theo chỉ dẫn.
- Thuốc Dostinex thường được thực hiện hai lần mỗi tuần trong ít nhất 6 tháng. Không dùng thuốc mỗi ngày trừ khi bác sĩ nói với bạn.
- Máu của bạn sẽ cần phải được kiểm tra thường xuyên để đo mức độ prolactin của bạn.
- Lưu trữ ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt.

Điều gì xảy ra nếu dùng quá liều?

- Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.
- Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm nghẹt mũi, ảo giác hoặc ngất xỉu.



Tôi nên tránh những gì khi dùng Dostinex?

- Tránh thức dậy quá nhanh từ tư thế ngồi hoặc nằm, hoặc bạn có thể cảm thấy chóng mặt.

Cách điều trị với thuốc dostinex

Thuốc Dostinex với khả năng ức chế tuyệt prolactin hiệu quả được sản xuất và điều trị vô sinh ở phụ nữ khá phổ biến. Cách sử dụng thuốc Dostinex cũng khá đa dạng, có thể dạng viên uống hoặc viên nén đặt hậu môn.

Đối với liều uống:

- Thuốc được bào chế với khối lượng 0.5 mg cabergoline / viên. Sử dụng cho người lớn: khởi đầu điều trị với 0.25 mg uống/lần, ngày uống 2 lần. Tăng liều lên dần mỗi lần 0.25 mg cho 1 liều nhưng không được đổi liều trong 4 tuần. Và tăng cho tới liều 1 mg uống ngày 2 lần.
- Có thể ngưng uống thuốc sau 6 tháng nếu thấy mức prolactin trong máu ở mức chấp nhận được. Do vậy, cần kiểm tra định kỳ mức prolactin để xem xét việc tái phát và điều trị trở lại hay không. Với trẻ em chưa có khuyến cáo sử dụng

Đối với liều đặt âm đạo:



- Sử dụng thuốc Dostinex đặt âm đạo cho những người không thể dung nạp prolactin ằng đường uống. Liều dùng 0.5 mg đặt âm đạo 2 – 5 lần/ tuần.
- Theo dõi và sử dụng liệu ở mức thấp nhất theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát triệu chứng



Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ – Thuốc đặc trị 247 (2)

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Cabergoline (Dostinex)?

Trước khi sử dụng thuốc Cabergoline, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn thường xuyên sử dụng các loại thuốc khác khiến bạn buồn ngủ (như thuốc cảm lạnh hoặc dị ứng, thuốc an thần, thuốc giảm đau



gây nghiện , thuốc ngủ, thuốc giãn cơ và thuốc trị co giật, trầm cảm hoặc lo lắng).

Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc khác mà bạn sử dụng, đặc biệt là:

- Chlorpromazine (Thorazine)
- Clarithromycin (Biaxin)
- Droperidol (Inapsine)
- Erythromycin (EES, eryped , Ery-Tab , Erythrocin và các loại khác)
- Fluphenazine (Permitil , Prolixin)
- Haloperidol (Haldol)
- Metoclopramide (Reglan)
- Perphenazine (Trilafon)
- Prochlorperazine (Compazine , Compro)
- Promethazine (Pentazine , Phenergan , Anergan, Antinaus)
- Thiothixene (Navane)
- Thioridazine (Mellaril)
- Trifluoperazine (Stelazine)
- Bất kỳ loại thuốc huyết áp

Tác dụng phụ của thuốc Dostinex

Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng : nổi mề đay ; khó thở; sưng mắt, môi, lưỡi hoặc cổ họng của bạn.



Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có:

- Khó thở (ngay cả khi nằm xuống)
- Đau ngực, ho khan hoặc hack
- Một cảm giác nhẹ đầu, giống như bạn có thể ngã đi
- Đau ở bên hông hoặc lưng dưới
- Ít hoặc không đi tiểu
- Sung ở mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn.

Bạn có thể đã tăng ham muốn tình dục, thúc giục bất thường để đánh bạc hoặc những thôi thúc mãnh liệt khác trong khi dùng thuốc Dostinex. Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu điều này xảy ra.

Các tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm:

- Buồn nôn, táo bón
- Cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi
- Đau đầu
- Chóng mặt
- Buồn ngủ
- Khô miệng

Ảnh hưởng của thuốc Dostinex đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú



- Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát từ việc sử dụng thuốc Cabergoline ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật chưa chứng minh được tác dụng gây quái thai, nhưng giảm khả năng sinh sản và độc tính của phôi đã được quan sát có liên quan đến hoạt động dược lực học.
- Thuốc Cabergoline chỉ nên được sử dụng trong khi mang thai nếu được chỉ định rõ ràng và sau khi đánh giá lợi ích, rủi ro chính xác.
- Do thời gian bán hủy dài của thuốc và dữ liệu hạn chế về phơi nhiễm tử cung, phụ nữ có kế hoạch mang thai nên ngừng sử dụng thuốc Cabergoline một tháng trước khi thụ thai. Nếu việc thụ thai xảy ra trong quá trình trị liệu, nên ngừng điều trị ngay khi thai được xác nhận để hạn chế tiếp xúc với thai nhi với thuốc.
- Trong chuột, thuốc Cabergoline hoặc chất chuyển hóa của nó được bài tiết qua sữa. Không có thông tin về bài tiết sữa mẹ ở người, tuy nhiên các bà mẹ khuyên không nên cho con bú trong trường hợp ức chế tiết sữa không thành công bằng thuốc Cabergoline. Vì nó ngăn ngừa sự tiết sữa, không nên dùng thuốc Cabergoline cho những bà mẹ bị rối loạn tăng prolactinemia muốn nuôi con bằng sữa mẹ.

Ảnh hưởng của thuốc Dostinex đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc



- Bệnh nhân nên cẩn thận khi thực hiện các hành động đòi hỏi phản ứng nhanh và chính xác trong quá trình bắt đầu điều trị.
- Trong những ngày đầu tiên sử dụng thuốc Cabergoline, bệnh nhân nên thận trọng về việc tham gia lại vào các hoạt động đòi hỏi phản ứng nhanh và chính xác như lái xe ô tô hoặc vận hành máy móc.
- Bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc Cabergoline và xuất hiện tình trạng buồn ngủ phải được thông báo để tránh lái xe hoặc tham gia vào các hoạt động mà sự tỉnh táo bị suy giảm có thể khiến bản thân và những người khác có nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong (ví dụ như máy vận hành) cho đến khi các tình trạng đó và tình trạng buồn ngủ đã được giải quyết.





Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ – Thuốc đặc trị 247 (3)

Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 0901.771.516 / 0933.049.874 (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc dostinex

<https://thuocdactri247.com/thuoc-dostinex-dieu-tri-vo-sinh-o-phu-nu-cao-prolactin/>



Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Dostinex 0.5mg Cabergoline** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

5.0 60 ★★★★★

Like this:


Có liên quan



Thuốc avodart điều trị phình đại tuyến tiền liệt
02/06/2019
In "Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt"



Thuốc actonel 35mg risedronate điều trị loãng xương
19/12/2017
In "Thuốc loãng xương"



Thuốc votrient 400mg pazopanib điều trị ung thư thận
11/05/2019
In "Thuốc điều trị ung thư thận"

