

Thuốc arimidex 1mg anastrozole điều trị ung thư vú

Bởi admin - 19/12/2017



Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole trị ung thư vú giai đoạn sớm - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole là một loại thuốc được chỉ định trong điều trị ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Thuốc được sử dụng cả trong điều trị bổ trợ (tức là sau phẫu thuật) và ung thư vú di căn. Thuốc làm giảm lượng estrogen mà cơ thể tạo ra. Anastrozole thuộc nhóm thuốc được gọi là chất ức chế aromatase. Thuốc ức chế enzyme aromatase, chịu trách nhiệm chuyển đổi androgen thành estrogen.

Thuốc **Arimidex 1mg Anastrozole** điều trị ung thư vú di căn giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247** ☎ **0901 771 516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh



nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



1. Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole là gì?
2. Thông tin cơ bản thuốc Arimidex 1mg Anastrozole
3. Thuốc Anastrozole 1mg được dùng như thế nào?
4. Điều gì xảy ra nếu bỏ lỡ một liều?
5. Điều gì xảy ra nếu quá liều?
6. Lưu ý trước khi dùng thuốc Arimidex 1mg Anastrozole
 - 6.1. Để đảm bảo Arimidex an toàn cho bạn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn có:
7. Chỉ định điều trị thuốc Arimidex 1mg Anastrozole
8. Chống chỉ định điều trị thuốc Arimidex 1mg Anastrozole
9. Những lưu ý đặc biệt và biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thuốc Arimidex
 - 9.1. Những lưu ý chung
 - 9.2. Ảnh hưởng đến mật độ xương
 - 9.3. Đối với suy gan
 - 9.4. Đối với suy thận
 - 9.5. Đối với trẻ em
 - 9.6. Quá mẫn với đường sữa
10. Mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Arimidex
11. Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Arimidex?
12. Tác dụng phụ của thuốc Arimidex
 - 12.1. Tác dụng phổ biến (xảy ra trên 30%):
 - 12.2. Tác dụng phụ ít phổ biến hơn (xảy ra ở 10-29%):
13. Cần liên hệ với bác sĩ của bạn khi gặp các triệu chứng sau
14. Ảnh hưởng của thuốc Arimidex đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
 - 14.1. Trường hợp mang thai
 - 14.2. Trường hợp cho con bú
 - 14.3. Khả năng sinh sản
15. Ảnh hưởng của thuốc Arimidex đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
16. Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 16.1. Like this:
 - 16.2. Có liên quan



Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole là gì?

Thuốc Arimidex (anastrozole) làm giảm nồng độ estrogen ở phụ nữ mãn kinh, có thể làm chậm sự phát triển của một số loại khối u vú cần estrogen để phát triển trong cơ thể.

Thuốc Arimidex được sử dụng để điều trị ung thư vú ở phụ nữ mãn kinh. Thuốc thường được trao cho những phụ nữ bị ung thư đã tiến triển ngay cả sau khi dùng tamoxifen (Nolvadex, Soltamox).

Thuốc Arimidex cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không được liệt kê trong hướng dẫn thuốc.

Thông tin cơ bản thuốc Arimidex 1mg Anastrozole

- Tên thương hiệu: **Arimidex**
- Thành phần hoạt chất: **Anastrozole**
- Hãng sản xuất: AstraZeneca
- Hàm lượng: 1mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 28 viên nén





Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole trị ung thư vú giai đoạn sớm - Thuốc đặc trị 247 (1)

Giá Thuốc Arimidex : Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**

Thuốc Anastrozole 1mg được dùng như thế nào?

- Thuốc Anastrozole là một viên thuốc, dùng để uống.
- Bạn nên dùng thuốc Anastrozole vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
- Bạn có thể dùng thuốc Anastrozole có hoặc không có thức ăn.
- Nếu bạn bỏ lỡ một liều thuốc Anastrozole, hãy uống ngay khi bạn nhớ trừ khi gần đến giờ cho liều tiếp theo. Đừng dùng một liều gấp đôi để tạo ra một liều đã quên.
- Bạn không nên ngừng dùng thuốc Anastrozole mà không thảo luận với bác sĩ, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe.



Lượng thuốc Anastrozole mà bạn sẽ nhận được phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả sức khỏe chung hoặc các vấn đề sức khỏe khác, và loại ung thư hoặc tình trạng đang được điều trị. Bác sĩ sẽ xác định liều của bạn và thời gian bạn sẽ dùng thuốc Anastrozole.

Điều gì xảy ra nếu bỏ lỡ một liều?

- Dùng liều đó ngay khi nhớ ra.
- Không dùng thêm thuốc để bù liều.
- Bỏ qua liều đã quên nếu gần đến giờ cho liều theo lịch tiếp theo của bạn.

Điều gì xảy ra nếu quá liều?

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Các thuốc quá liều không được sử dụng vì các thành phần hoạt chất đã bị biến đổi, có thể xảy ra tác dụng phụ nặng hoặc nhẹ không mong muốn.

Lưu ý trước khi dùng thuốc **Arimidex 1mg Anastrozole**

Bạn không nên sử dụng thuốc Arimidex nếu bạn bị dị ứng với anastrozole, nếu bạn đang cho con bú hoặc nếu bạn chưa mãn kinh.

Thuốc Arimidex không được sử dụng ở nam giới hoặc trẻ em.



Để đảm bảo Arimidex an toàn cho bạn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn có:

- Bệnh tim
- Vấn đề lưu thông
- Tiền sử đột quy hoặc cục máu đông
- Bệnh gan nặng
- Cholesterol cao
- Loãng xương hoặc mật độ khoáng xương thấp

Thuốc Arimidex có thể làm giảm mật độ khoáng xương, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Mật độ khoáng xương của bạn có thể cần phải được kiểm tra trước và trong khi điều trị bằng anastrozole.

Bạn có thể cần phải thử thai trước khi sử dụng thuốc Arimidex, để đảm bảo bạn không mang thai.

Chỉ định điều trị thuốc Arimidex 1mg **Anastrozole**

Thuốc Arimidex được chỉ định cho:

- Điều trị ung thư vú tiến triển dương tính với thụ thể hoóc môn ở phụ nữ mãn kinh.
- Điều trị hỗ trợ ung thư vú xâm lấn sớm thụ thể hoóc-môn dương tính ở phụ nữ mãn kinh.
- Điều trị hỗ trợ ung thư vú xâm lấn sớm thụ thể hoóc-môn dương tính ở phụ nữ sau mãn kinh đã nhận được 3 đến 3 năm tamoxifen hỗ trợ.

Chống chỉ định điều trị thuốc Arimidex 1mg Anastrozole

Thuốc Arimidex chống chỉ định trong:

- Thuốc được chống chỉ định không sử dụng cho trẻ nhỏ.
- Không sử dụng cho phụ nữ loãng xương hoặc có nguy cơ loãng xương.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Bệnh nhân suy thận, suy gan mức độ trung bình hoặc nặng thì cần xem xét đến khả năng điều trị và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe để cân nhắc sử dụng.
- Không sử dụng kết hợp với các thành phần hợp chất có cấu trúc LHRH.
- Bệnh nhân đang điều trị với tamoxifen hoặc có oestrogen.

Những lưu ý đặc biệt và biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thuốc Arimidex

Những lưu ý chung

- Thuốc Arimidex không được sử dụng ở phụ nữ tiền mãn kinh. Thời kỳ mãn kinh nên được xác định về mặt sinh hóa (luteinizing-hormone [LH], hormone kích thích nang trứng [FSH] và nồng độ estradiol) ở bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ về tình trạng mãn kinh.
- Nên tránh sử dụng đồng thời các liệu pháp chứa tamoxifen hoặc estrogen với Arimidex vì điều này có thể làm giảm tác dụng dược lý của thuốc.

Ảnh hưởng đến mật độ xương



- Khi thuốc Arimidex làm giảm nồng độ estrogen lưu thông, thuốc có thể làm giảm mật độ khoáng xương với nguy cơ gãy xương có thể tăng lên.
- Phụ nữ bị loãng xương hoặc có nguy cơ mắc bệnh loãng xương, nên đánh giá chính thức mật độ xương của họ khi bắt đầu điều trị và trong khoảng thời gian đều đặn sau đó.
- Điều trị hoặc điều trị dự phòng loãng xương nên được bắt đầu khi thích hợp và được theo dõi cẩn thận.

Đối với suy gan

- Thuốc Arimidex chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân ung thư vú bị suy gan trung bình hoặc nặng. Phơi nhiễm với anastrozole có thể tăng ở những người bị suy gan.
- Sử dụng thuốc Arimidex ở bệnh nhân suy gan trung bình và nặng nên được thực hiện thận trọng. Điều trị nên được dựa trên đánh giá rủi ro lợi ích cho từng bệnh nhân.

Đối với suy thận

- Thuốc Arimidex chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân ung thư vú bị suy thận nặng. Phơi nhiễm với anastrozole không tăng ở những người bị suy thận nặng ở những bệnh nhân bị suy thận nặng, nên thận trọng khi dùng Arimidex.

Đối với trẻ em



- Thuốc Arimidex không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên vì tính an toàn và hiệu quả chưa được thiết lập ở nhóm bệnh nhân này.
- Thuốc Arimidex không nên được sử dụng ở những bé trai bị thiếu hụt hormone tăng trưởng bên cạnh việc điều trị hormone tăng trưởng vì anastrozole làm giảm nồng độ estradiol
- Thuốc Arimidex không được sử dụng ở những bé gái bị thiếu hormone tăng trưởng bên cạnh việc điều trị hormone tăng trưởng. Dữ liệu an toàn dài hạn ở trẻ em và thanh thiếu niên không có sẵn.

Quá mẫn với đường sữa

- Sản phẩm này có chứa đường sữa. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, thiếu hụt Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc.



Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole trị ung thư vú giai đoạn sớm - Thuốc đặc trị 247 (2)



Mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Arimidex

- Thuốc Acetaminophen hoặc ibuprofen có thể giúp giảm bớt sự khó chịu từ những cơn đau nhức toàn thân. Tuy nhiên, hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng nó.
- Thuốc Anastrozole gây buồn nôn ít. Tuy nhiên, để giảm buồn nôn, hãy dùng thuốc chống buồn nôn theo chỉ định của bác sĩ trước khi dùng.
- Thực hành tốt cho sức khỏe như nghỉ ngơi nhiều và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cùng với tập thể dục thường xuyên được khuyến khích
- Nếu bạn gặp các triệu chứng hoặc tác dụng phụ, hãy chắc chắn thảo luận với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ có thể kê đơn thuốc hoặc đưa ra các đề xuất khác có hiệu quả trong việc quản lý các vấn đề đó.

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Arimidex?

- Thuốc Arimidex có thể không hoạt động tốt nếu bạn dùng chung với thuốc estrogen (như liệu pháp thay thế hormone, kem estrogen hoặc thuốc tránh thai, tiêm, cấy ghép, vá da và vòng âm đạo). Trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc Arimidex, hãy nói với bác sĩ nếu bạn cũng dùng tamoxifen hoặc estrogen.
- Các loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc Arimidex, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược.

Tác dụng phụ của thuốc Arimidex



Những điều quan trọng cần nhớ về tác dụng phụ của anastrozole:

- Hầu hết mọi người không trải nghiệm tất cả các tác dụng phụ thuốc anastrozole được liệt kê.
- Tác dụng phụ của thuốc Anastrozole thường được dự đoán về sự khởi phát, thời gian và mức độ nghiêm trọng của chúng, sẽ được cải thiện sau khi trị liệu xong.
- Tác dụng phụ của thuốc Anastrozole có thể khá dễ quản lý, có nhiều lựa chọn để giúp giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tác dụng phụ của anastrozole.

Tác dụng phổ biến (xảy ra trên 30%):

- Nóng bừng
- Đau cơ, khớp
- Đau dạ dày

Tác dụng phụ ít phổ biến hơn (xảy ra ở 10-29%):

- Năng lượng giảm;
- Rối loạn tâm trạng;
- Phát ban, buồn nôn;
- Loãng xương (yếu xương);
- Đau lưng, đau đầu;
- Mất ngủ (Khó ngủ);
- Viêm họng, huyết áp cao, phiền muộn;
- Phù ngoại biên và phù bạch huyết (tích tụ chất lỏng);
- Khó thở (khó thở), ho nhiều.

Không phải tất cả các tác dụng phụ được liệt kê ở trên, một số hiếm gặp (xảy ra ở dưới 10% bệnh nhân) không được liệt kê ở đây. Tuy



nhiên, bạn phải luôn thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Cần liên hệ với bác sĩ của bạn khi gặp các triệu chứng sau

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức, ngày hay đêm và đến phòng cấp cứu gần nhất.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

- Khó nuốt hoặc khó thở
- Chảy máu âm đạo (tương tự như một khoảng thời gian)
- Ngứa, ngứa ran hoặc tê da
- Đau ngực mới hoặc xấu đi
- Sung mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng
- Buồn nôn (nôn hơn 4-5 lần trong 24 giờ)
- Vàng da hoặc lòng trắng mắt
- Đau ở bên phải của khu vực dạ dày của bạn

Các triệu chứng sau đây cần được chăm sóc y tế, nhưng không phải là tình huống khẩn cấp.

Ảnh hưởng của thuốc Arimidex đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Trường hợp mang thai



- Không có dữ liệu từ việc sử dụng Arimidex ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh sản.
- Thuốc Arimidex chống chỉ định trong thai kỳ.

Trường hợp cho con bú

- Không có dữ liệu về việc sử dụng thuốc Arimidex trong thời kỳ cho con bú. Thuốc Arimidex chống chỉ định trong thời gian cho con bú.

Khả năng sinh sản

- Tác dụng của thuốc Arimidex đối với khả năng sinh sản ở người chưa được nghiên cứu. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh sản.



Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole trị ung thư vú giai đoạn sớm - Thuốc đặc trị 247 (3)

Ảnh hưởng của thuốc Arimidex đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Thuốc Arimidex không có hoặc có ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.
- Thuốc gây ra chứng suy nhược và buồn ngủ đã được báo cáo khi sử dụng Arimidex và cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi các triệu chứng như vậy vẫn tồn tại.

Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc arimidex

<https://thuocdactri247.com/dieu-tri-ung-thu-vu-giai-doan-dau-voi-thuoc-arimidex/>

» Xem thêm thuốc aromasin điều trị ung thư vú

<https://thuocdactri247.com/day-lui-ung-thu-vu-o-phu-nu-man-kinh-voi-thuoc-aromasin/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Arimidex 1mg Anastrozole** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.



Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

4.9 62



 Like this:


Có liên quan



Thuốc herceptin
150mg trastuzumab
giá bao nhiêu
20/12/2017
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"



Thuốc aromasin 25mg
exemestane điều trị
ung thư vú
17/07/2017
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"



Thuốc tykerb 250mg
lapatinib điều trị ung
thư vú
21/05/2019
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"

