

Effets secondaires de Priligy

Priligy est un médicament pharmaceutique utilisé pour le remède de l'éjaculation pré-éjaculatoire chez les hommes et les femmes. Priligy est un nom générique pour un médicament antidépresseur appelé ISRS. La dapoxétine est un médicament antidépresseur normalement prescrit utilisé pour la gestion de l'éjaculation pré-éjaculatoire chez les hommes et les femmes. La dapoxétine inhibe le transporteur de la sérotonine, augmente l'activité de la sérotonine au niveau de la fente synaptique, réduit la latence de l'éjaculation et favorise donc l'éjaculation pré-éjaculatoire.

Ce médicament a été initialement créé pour traiter le trouble obsessionnel compulsif (TOC), mais il s'est avéré utile dans la gestion de l'éjaculation pré-éjaculatoire et de l'éjaculation précoce. Cela dit, il existe des effets secondaires possibles qui pourraient l'emporter sur les avantages de travailler avec le médicament.

L'impact secondaire le plus répandu de Priligy est une augmentation de la libido. Ceci est déclenché par une réduction de la sérotonine dans le cerveau. Ceci est généralement doux et ne se produit presque jamais, cela dit. Cela n'implique pas que la fonction sexuelle est diminuée, mais que le patient peut avoir plus de mal à atteindre l'orgasme lorsqu'il est excité sexuellement. Cela peut généralement prendre plusieurs semaines pour que ces réductions de sérotonine soient remarquées.

Certains des autres effets secondaires liés à l'utilisation de Dapoxetine sont une diminution de la libido, des nausées, des étourdissements, des maux de tête, des maux d'estomac, de l'insomnie et un dysfonctionnement sexuel. Ces effets secondaires diffèrent selon le patient et la façon dont le médicament est pris. Il est essentiel que les personnes atteintes respectent les instructions fournies avec le médicament. S'ils ne sont pas suivis, le médicament pourrait essentiellement améliorer leur gravité. Par conséquent, il est essentiel que le patient ait un entretien avec son médecin au sujet du médicament afin d'éviter les effets secondaires dangereux ou inutiles.

Il existe également un certain nombre de précautions que les individus peuvent prendre pour éviter les effets secondaires potentiels de la prise de Priligy. Si le patient estime qu'il pourrait éventuellement subir un impact indésirable après avoir utilisé le médicament, il doit immédiatement cesser d'appliquer le médicament et consulter un médecin qualifié en matière de santé.

Une autre façon de réduire les effets secondaires de Priligy est de demander l'avis de votre médecin avant de prendre le médicament. Ils peuvent être en mesure de vous donner des suggestions sur les méthodes pour réduire les risques possibles du médicament. Dans de nombreuses situations, le médicament peut être utilisé en toute sécurité avec d'autres types d'antidépresseurs et de médicaments.

Les effets secondaires ci-dessus de Priligy ont été comparés à certains des effets secondaires importants supplémentaires qui peuvent survenir avec les antidépresseurs. cette recherche le médicament soit utilisé pour traiter l'éjaculation pré-éjaculatoire et l'éjaculation précoce, il ne remédie pas à ces circonstances. Il est important pour le patient de bien comprendre que ce médicament ne fonctionnera pas pour tout le monde et ne garantira pas une amélioration de la performance sexuelle globale. Bien que le médicament fonctionne dans le traitement de l'éjaculation pré-éjaculatoire et de l'éjaculation précoce, il

est important que les personnes atteintes se souviennent que ce n'est pas le seul problème ou la seule thérapie.

La meilleure question qu'un patient puisse faire pour lui-même est d'étudier et de demander des enquêtes avant de prendre la décision de prendre toute sorte de médicaments sur ordonnance. qui comprend tout nouveau médicament. Il est également crucial de découvrir comment le médicament interagira avec les autres médicaments ou thérapies que le patient prend actuellement et combien de temps il faudra pour que les avantages se manifestent.