

Để đủ điều kiện dùng Alecensa, xét nghiệm chẩn đoán phải xác nhận rằng NSCLC của bạn là do protein ALK bất thường gây ra.

Nếu bạn và bác sĩ của bạn quyết định rằng Alecensa phù hợp với bạn, các mục tiêu điều trị có thể được đặt ra để xem các khối u ALK + mNSCLC của bạn đáp ứng với điều trị bằng Alecensa như thế nào.

Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc Alecensa 150mg Alectinib
2. Chỉ định điều trị thuốc Alecensa 150mg Alectinib
3. Những lưu ý trước khi dùng thuốc Alecensa
4. Tôi nên dùng thuốc Alecensa 150mg Alectinib như thế nào?
5. Thuốc Alecensa được dùng với liều lượng như thế nào?
 - 5.1. Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ:
6. Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?
7. Điều gì xảy ra nếu tôi quá liều?
8. Tôi nên tránh những gì khi dùng thuốc Alecensa?
9. Tác dụng phụ thuốc Alecensa
 - 9.1. Vấn đề về nhịp tim chậm:
 - 9.2. Đau cơ bắp và yếu cơ:
 - 9.3. Vấn đề về thận:
 - 9.4. Vấn đề về gan:
 - 9.5. Vấn đề về phổi:
10. Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Alecensa?
11. Liên hệ gì với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn
12. Một số biện pháp phòng ngừa
13. Một số mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Alecensa
14. Ảnh hưởng của thuốc Alecensa tới khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
 - 14.1. Khả năng sinh sản
 - 14.2. Phụ nữ có khả năng sinh con và tránh thai
 - 14.3. Khả năng mang thai
 - 14.4. Khả năng cho con bú
15. Ảnh hưởng của thuốc Alecensa đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
16. Thuốc Alecensa 150mg Alectinib mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 16.1. Like this:
 - 16.2. Có liên quan



Thông tin cơ bản thuốc Alecensa 150mg Alectinib

- Tên thương hiệu: **Alecensa**
- Thành phần hoạt chất: **Alectinib**
- Hãng sản xuất: Roche
- Hàm lượng: 150mg
- Dạng: Viên nhộng
- Đóng gói: Hộp 224 viên bên trong chứa 4 hộp nhỏ 56 viên

Giá thuốc Alecensa: Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage [Thuốc Đặc Trị 247](https://thuocdactri247.com)



Thuốc Alecensa 150mg alectinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chỉ định điều trị thuốc **Alecensa 150mg Alectinib**

- Thuốc Alecensa chỉ định trong điều trị cho bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ (NK) không di căn (ALK)
- Thuốc Alecensa chỉ định để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành có NSCLC tiên tiến dương tính với ALK đã được điều trị trước đó bằng thuốc crizotinib.



Những lưu ý trước khi dùng thuốc Alecensa

Trước khi bạn dùng thuốc alectinib, hãy nói với bác sĩ về tất cả các tình trạng y tế của bạn, bao gồm cả nếu bạn:

- Có vấn đề về gan
- Có nhịp tim chậm
- Có vấn đề về phổi hoặc hô hấp
- Đang mang thai hoặc dự định có thai.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có thai trong khi điều trị bằng alectinib hoặc nghĩ rằng bạn có thể mang thai.

Nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị bằng thuốc alectinib và trong 1 tuần sau liều cuối cùng

Đàn ông có bạn tình là phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị bằng thuốc và trong 3 tháng sau liều cuối cùng

Đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Không cho con bú trong khi điều trị bằng thuốc alectinib và trong 1 tuần sau liều cuối cùng. Nói chuyện với bác sĩ về cách tốt nhất để cho bé ăn trong thời gian này

Tôi nên dùng thuốc Alecensa 150mg Alectinib như thế nào?



- Trước khi bạn bắt đầu điều trị bằng thuốc Alecensa, bác sĩ sẽ thực hiện một xét nghiệm đặc biệt để đảm bảo thuốc Alectinib là phương pháp điều trị tốt nhất cho loại ung thư phổi của bạn.
- Trước khi sử dụng thuốc Alecensa hoặc thuốc bất kỳ, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bác sĩ của bạn đôi khi có thể thay đổi liều của bạn. Sử dụng thuốc chính xác theo chỉ dẫn.
- Thuốc Alecensa hoạt động tốt nhất nếu bạn dùng thuốc với thức ăn.
- Khi dùng thuốc nên nuốt cả viên nang và không nghiền nát, nhai, hòa tan hoặc mở thuốc.
- Nếu bạn nôn ngay sau khi uống thuốc Alecensa, không dùng liều khác. Chờ cho đến khi thời gian liều theo lịch trình tiếp theo của bạn để uống thuốc lại.
- Bạn cần xét nghiệm y tế thường xuyên để chắc rằng thuốc không gây ra tác dụng có hại. Phương pháp điều trị ung thư của bạn có thể bị trì hoãn dựa trên kết quả.

Thuốc Alecensa được dùng với liều lượng như thế nào?

Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ:

- Hàm lượng 600mg uống hai lần một ngày
- Thời gian điều trị: Cho đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không được chấp nhận và thuốc nên được dùng cùng với thức ăn.
- Sử dụng: Điều trị bệnh nhân ung thư phổi không di căn (ALK), ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn (NSCLC) đã tiến triển hoặc không dung nạp với crizotinib.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?



- Bỏ qua liều đã quên và sử dụng liều tiếp theo của bạn vào thời gian thường xuyên.
- Không được sử dụng hai liều cùng một lúc, điều này có thể dẫn đến các trường hợp quá liều.

Điều gì xảy ra nếu tôi quá liều?

- Nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp



Thuốc alecensa 150mg alectinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (2)

Tôi nên tránh những gì khi dùng thuốc Alecensa?



- Thuốc Alectinib có thể làm bạn dễ bị cháy nắng hơn. Tránh ánh nắng mặt trời trong khi điều trị và trong ít nhất 7 ngày sau liều thuốc Alecensa cuối cùng của bạn.
- Mặc quần áo bảo hộ và sử dụng kem chống nắng (SPF 50 trở lên) khi bạn ở ngoài trời.

Tác dụng phụ thuốc Alecensa

Vấn đề về nhịp tim chậm:

- Thuốc Alecensa có thể gây ra nhịp tim rất chậm có thể nghiêm trọng. Bác sĩ sẽ kiểm tra nhịp tim và huyết áp của bạn trong quá trình điều trị bằng Alecensa.
- Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn cảm thấy chóng mặt, lâng lâng hoặc nếu bạn bị ngất trong khi điều trị với Alecensa.
- Khi dùng bất kỳ các loại thuốc tim hoặc huyết áp nên cho bác sĩ biết.

Đau cơ bắp và yếu cơ:

- Các vấn đề về cơ bắp là phổ biến với Alecensa và có thể nghiêm trọng.
- Bác sĩ sẽ làm xét nghiệm máu ít nhất 2 tuần một lần trong tháng đầu tiên và khi cần thiết trong quá trình điều trị bằng Alecensa.

Vấn đề về thận:

- Thuốc Alecensa có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thận hoặc đe dọa tính mạng.
- Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có một sự thay đổi về số lượng hoặc màu sắc của nước tiểu, hoặc nếu bạn bị sưng mới hoặc xấu đi ở chân hoặc bàn chân.

Vấn đề về gan:



- Chảy máu hoặc bầm tím
- Thuốc có thể gây tổn thương gan.
- Bác sĩ sẽ làm xét nghiệm máu ít nhất 2 tuần một lần trong 3 tháng đầu
- Bị vàng da hoặc tròng trắng mắt, nước tiểu đậm, da ngứa
- Buồn nôn hoặc nôn mửa, đau ở bên phải của khu vực dạ dày của bạn

Vấn đề về phổi:

- Thuốc Alecensa có thể gây sưng (viêm) nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng của phổi trong quá trình điều trị.
- Các triệu chứng có thể tương tự như các triệu chứng từ ung thư phổi.
- Báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng mới hoặc xấu đi, bao gồm: khó thở, hay bị ho và sốt

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc

Alecensa?

- Các loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc Alectinib, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược .
- Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc hiện tại của bạn và bất kỳ loại thuốc bạn bắt đầu hoặc ngừng sử dụng.

Liên hệ gì với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:



- Sốt từ 100,4 F F (38 độ C) trở lên, ớn lạnh (có thể có dấu hiệu nhiễm trùng)
- Dấu hiệu của phản ứng dị ứng, như phát ban, nổi mề đay, ngứa, đỏ, sưng, phỏng rộp hoặc bong tróc da có hoặc không sốt, thở khò khè, tức ngực, khó thở hoặc nói chuyện, khó thở, ho là mới hoặc tệ hơn, khàn giọng bất thường, hoặc sưng miệng, mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng.
- Buồn nôn (cản trở khả năng ăn uống và không giảm bớt thuốc được kê đơn)
- Nôn (nôn hơn 4-5 lần trong 24 giờ)
- Tiêu chảy (4 – 6 tập trong khoảng thời gian 24 giờ).
- Không thể ăn hoặc uống trong 24 giờ hoặc có dấu hiệu mất nước: mệt mỏi, khát nước, khô miệng, tối và giảm lượng nước tiểu, hoặc chóng mặt.
- Da hoặc lòng trắng mắt của bạn chuyển sang màu vàng.
- Nước tiểu chuyển sang màu sẫm hoặc nâu (màu trà)
- Đau bên phải dạ dày của bạn
- Chảy máu hoặc bầm tím dễ dàng hơn bình thường
- Ngứa, ho có hoặc không có chất nhầy
- Mệt mỏi cực độ (không thể thực hiện các hoạt động tự chăm sóc)
- Đau cơ không rõ nguyên nhân, đau hoặc yếu
- Chóng mặt, chóng mặt, hoặc ngất xỉu.

Luôn luôn thông báo cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường.

Một số biện pháp phòng ngừa



- Trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc Alectinib, hãy đảm bảo bạn nói với bác sĩ về bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn đang dùng (bao gồm thuốc kê đơn, không kê đơn, vitamin, thuốc thảo dược, v.v.).
- Không nhận được bất kỳ loại chủng ngừa hoặc tiêm chủng mà không có sự chấp thuận của bác sĩ trong khi dùng thuốc Alectinib.
- Thông báo cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đang mang thai hoặc có thể mang thai trước khi bắt đầu điều trị. Mang thai loại D (thuốc Alectinib có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Phụ nữ đang mang thai hoặc mang thai phải được thông báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn cho thai nhi).
- Đối với cả nam và nữ: Sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả, và không thụ thai một đứa trẻ (có thai) trong khi dùng thuốc Alectinib cho đến 6 tháng sau liều thuốc Alectinib cuối cùng.
- Không cho con bú trong khi dùng thuốc Alectinib.

Một số mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Alecensa

- Bạn nên uống ít nhất từ 2 lít đến 3 lít nước mỗi 24 giờ, trừ khi bạn được hướng dẫn khác.
- Bạn có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng, cố gắng tránh đám đông hoặc người bị cảm lạnh.
- Rửa tay thường xuyên, nghỉ ngơi nhiều và duy trì dinh dưỡng tốt
- Để giảm buồn nôn, dùng thuốc chống buồn nôn theo chỉ định của bác sĩ và ăn các bữa ăn nhỏ. Hãy thử dùng thuốc Alectinib khi đi ngủ.
- Tránh phơi nắng. Mặc kem chống nắng SPF 30 (hoặc cao hơn) và quần áo bảo hộ.
- Uống đồ uống có cồn nên được giữ ở mức tối thiểu hoặc tránh hoàn toàn. Bạn nên thảo luận với bác sĩ của bạn.
- Vẫn hoạt động như bạn có thể. Tập thể dục nhẹ nhàng được khuyến khích như đi bộ hàng ngày.
- Nếu bạn gặp các triệu chứng hoặc tác dụng phụ, hãy chắc chắn thảo luận với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ có thể kê đơn thuốc hoặc đưa ra các đề xuất khác có hiệu quả hơn.





Thuốc alecensa 150mg alectinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (3)

Ảnh hưởng của thuốc Alecensa tới khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Khả năng sinh sản



- Không có nghiên cứu về khả năng sinh sản ở động vật đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của thuốc Alecensa.
- Không có tác dụng phụ trên cơ quan sinh sản nam và nữ đã được quan sát trong các nghiên cứu độc tính chung.

Phụ nữ có khả năng sinh con và tránh thai

- Phụ nữ có khả năng sinh con phải được khuyến cáo để tránh mang thai trong khi dùng thuốc Alecensa.
- Bệnh nhân nữ có khả năng sinh con phải sử dụng các biện pháp tránh thai có hiệu quả cao trong quá trình điều trị và trong ít nhất 3 tháng sau liều thuốc Alecensa cuối cùng.

Khả năng mang thai

- Không có hoặc giới hạn số lượng dữ liệu từ việc sử dụng thuốc Alecensa ở phụ nữ mang thai. Dựa trên cơ chế hoạt động của thuốc, thuốc Alecensa có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai.
- Bệnh nhân nữ, người mang thai trong khi dùng thuốc Alecensa hoặc trong 3 tháng sau liều thuốc Alecensa cuối cùng phải liên hệ với bác sĩ của họ và nên được thông báo về tác hại tiềm ẩn đối với thai nhi.

Khả năng cho con bú

- Người ta không biết liệu thuốc Alectinib và các chất chuyển hóa của thuốc được bài tiết qua sữa mẹ.
- Không thể loại trừ nguy cơ cho trẻ sơ sinh. Các bà mẹ nên được khuyến khích không nên cho con bú trong khi nhận được thuốc Alecensa.

Ảnh hưởng của thuốc Alecensa đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc



- Thuốc Alecensa có ảnh hưởng nhỏ đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.
- Cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc vì bệnh nhân có thể gặp nhịp tim chậm có triệu chứng (ví dụ như ngất, chóng mặt, hạ huyết áp) hoặc rối loạn thị lực khi dùng thuốc Alecensa.

Thuốc Alecensa 150mg Alectinib mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp). Mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc Alecensa

<https://thuocdactri247.com/thuoc-alecensa-dieu-tri-ung-thu-phoi-hieu-qua-gia-thuoc-alecensa/>

» Xem thêm thuốc osicent điều trị ung thư phổi

<https://thuocdactri247.com/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/>


Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Alecensa 150mg Alectinib** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

5.0 77 

Like this:




Có liên quan

~~Thuốc ofev 150mg
nintedanib điều trị bệnh
xơ phổi~~
06/05/2019
In "Thuốc điều trị ung
thư phổi"



~~Thuốc herceptin 150mg
trastuzumab giá bao
nhiều~~
20/12/2017
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"



~~Thuốc iressa 250mg
gefitinib~~
19/12/2017
In "Thuốc điều trị ung
thư phổi"

