

ALTERNATIVA



Solfac® EW 50



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience

Solfac® EW 50



- **Solfac® EW 50** (Cyfluthrin 5%w/w) este un insecticid extrem de versatil, ce actioneaza prin contact si ingestie, avand drept substanta activa un piretroid sintetic;
- **Solfac® EW 50** este conditionat sub forma de macro-emulsie in dispersie apoasa, fapt ce-i confera eficacitate sporita, usurinta in formarea amestecului de lucru si rezidualitate ridicata, toate acestea in conditii de siguranta pentru aplicator;
- **Solfac® EW 50** este biodegradabil, nu pateaza, nu lasa urme vizibile dupa aplicare si nu este inflamabil;
- **Solfac® EW 50** manifesta o eficacitate deosebita impotriva tuturor artropodelor, indiferent daca sunt insecte, centipede, milipede sau arahnid, cu un plus de eficacitate in **combaterea puricilor, capuselor, paduchilor, plosnitelor si gandacilor** de toate felurile;
- **Solfac® EW 50** este recomandat a se folosi in **fermele zootehnice** (adaposturi pentru animale si pasari), in combinatie cu **QuickBayt® Spray WG 10**, pentru eradicarea daunatorilor specifici (muste, purici, gandaci, etc) prin aplicare reziduala sau prin nebulizare ("ceata rece").
- **Solfac® EW 50** nu are efecte negative pregnante, daca este aplicat conform indicatiilor de pe eticheta, asupra plantelor (nu este fitotoxic) sau vietuitoarelor non-vizate (animale domestice, pasari, etc);
- Aplicarea **Solfac® EW 50** se face rezidual cu echipamente specifice activitatii de dezinsectie – pompa



de presiune scazuta – sau prin nebulizare ("ceata rece"), recomandandu-se dilutia doar cu apa (este interzisa dilutia cu solventi organici);

• **Solfac® EW 50** poate fi aplicat si in interior si la exterior; **in interior** se va insista cu precadere pe locurile unde daunatorii se ascund sau se odihnesc (crapaturi, grinzi, tocurile usilor si ferestrelor); **la exterior** se va pulveriza la baza incintelor ce se doresc a fi protejate, pe peretii exteriori, dar si pe vegetatia existenta pe o raza de 20-50m;

• **Solfac® EW 50** da rezultate foarte bune si in **protectia impotriva tantarilor a locuintelor private** (gospodarii personale), mai ales daca este aplicat pe vegetatia din curte si pe peretii exteriori ai locuintelor, in regim-semiprofesional (DIY), in combinatie cu **K-Othrine® WG 250**;

• **Solfac® EW 50** are o remanenta de 6 pana la 8 saptamani, in functie de tipul suprafetei pe care se aplica si de curatenia acesteia, in cazul in care este aplicat in interior;



Profil tehnic:

Compozitie:

100 g de Solfac® EW 50 contin:
Cyfluthrin 5 g (5%) ~ 50 g/l
Coformulatori pana la 100 g

Formulare:

Emulsie in dispersie apoasa (EW)

Clasificare toxicologica:

Xi - iritant

Clasificare de mediu:

N - periculos pentru mediu

Categorie de utilizatori:

Profesionali, Populatie

Avis:

Nr. 378BIO/18/05.14

Ambalaj:

Flacon de 1000 ml

Dozaj:

Solfac EW 50

40 - 60 ml

Apa

4 - 5 litri

Aria de actiune

100 - 120 m²

) pentru o infestare masiva, recomandam dublarea dozei de produs;



Bayer Environmental Science

Tel: 021.529.5900 | Fax: 021.529.5990

Mobil: 0724 214 365

E-mail: bogdan.pitigoi@bayer-ag.de

www.bayercropscience.ro

DISCLAIMER
Acest leaflet reprezinta un document publicitar si nu atrage nici un fel de responsabilitate juridica pentru grupul Bayer AG sau entitatile sale afiliate. Pentru utilizarea corecta a produselor cititi cu mare atentie si respectati intocmai indicatiile de pe eticheta produselor.