

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/13/0018**  
**LV Butasal-100 šķīdums injekcijām liellopiem, suņiem un kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Interchemie Werken “De Adelaar” Eesti AS  
Vananpere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald, 74013 Harjumaa  
Igaunija  
Tel: +372 6 005 005

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**LV Butasal-100** šķīdums injekcijām liellopiem, suņiem un kaķiem

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1ml šķīduma satur:

**Aktīvās vielas:**

Butafosfāns 100 mg  
Ciānkobalamīns 50 µg

**Palīgvielas:**

Benzilalspirs  
Nātrijs hidroksīds  
Ūdens injekcijām

Dzidrs, rozā šķīdums injekcijām.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Liellopiem, suņiem un kaķiem:

- akūtu vai hronisku vielmaiņas traucējumu ārstēšanai novājinātiem dzīvniekiem, kurus izraisījis sliks uzturs, nepareiza kopšana vai saslimšanas (attīstības un barošanas traucējumi jauniem dzīvniekiem, sekundārā ketoze govīm);
- var lietot kā papildlīdzekli neauglības profilaksei pēcdzemdību slimību gadījumos un neauglības ārstēšanai;
- LV Butasal-100 darbojas spēcinoši stresa, pārpūles, spēku izsīkuma, pazeminātas imunitātes gadījumā un kā tonizējošs līdzeklis vispārēja vārguma, sekundārās anēmijas un organizma atdzišanas gadījumā;
- LV Butasal-100 veicina muskulatūras attīstību un to var lietot kā papildlīdzekli kopā ar kalciju un magniju tētānijas un parēzes gadījumos.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi, suņi un kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Intramuskulārai, intravenozai vai subkutānai lietošanai.

Intravenozai ievadīšanai lielopiem: 5–25 ml, teļiem 5–12 ml.

Intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai suņiem un kaķiem: 0,5–5 ml.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Ja nepieciešams, drīkst ievadīt atkārtoti.

Hronisku saslimšanu gadījumā lietot pusi no devas ar 1-2 nedēļu vai īsāku starplaiku.

Kliniski veseliem dzīvniekiem ievadīt pusi no devas.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī (2°C - 8 °C).

Sargāt no tiešiem saules stariem. Nesasaldēt.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

### Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Parenterālas ievadīšanas laikā ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus. Izvairīties injicēt zāles caur netīru vai samirkusu ādu, kā arī mitros vai putekļainos apstākļos. Ja nepieciešams injicēt vairāk kā 20 ml šķiduma, tas jāsadala un jāinjicē vairākās injekciju vietās.

### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no nejaušas pašinjicešanas, nejaušas saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs.

### Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

### Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozējot LV Butasal-100 toksisku iedarbību nenovēro.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

01/2018

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: brūns 50 ml un 100 ml II tipa stikla flakons, kas noslēgts ar sterilu gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.