

Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư

Bởi **Đức thành Không** - 16/08/2019



Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư vú, ung thư phổi - Thuốc đặc trị 247

Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư vú, ung thư phổi hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc navelbine 30mg vinorelbine
2. Thuốc navelbine là gì? Thuốc vinorelbine sử dụng để làm gì?
3. Chỉ định điều trị thuốc navelbine cho ai?
4. Chống chỉ định điều trị thuốc navelbine với những ai?
5. Thông tin quan trọng trước khi dùng thuốc navelbine là gì?
6. Chăm sóc đặc biệt khi sử dụng thuốc navelbine ra sao?
7. Liều dùng thuốc navelbine 30mg bao nhiêu?
8. Nên làm gì khi dùng quá liều thuốc navelbine?
9. Nên làm gì khi quên một liều thuốc navelbine?
10. Nên làm gì khi muốn ngừng uống thuốc navelbine
11. Sử dụng thuốc navelbine như thế nào cho đúng?
12. Thuốc vinorelbine tương tác với thuốc nào?
13. Tác dụng phụ thuốc navelbine là gì?
 - 13.1. Tác dụng phụ rất phổ biến(có thể xảy ra ở hơn 1 trên 10 bệnh nhân được điều trị)
 - 13.2. Tác dụng phụ thường gặp(có thể xảy ra ở dưới 1 trong 10 bệnh nhân được điều trị)
 - 13.3. Tác dụng phụ không phổ biến (có thể xảy ra ở hơn 1 trong 100 bệnh nhân được điều trị)
14. Ảnh hưởng navelbine đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?
 - 14.1. Vinorelbine đối với khả năng sinh sản thế nào?
 - 14.2. Vinorelbine đối với phụ nữ mang thai ra sao?
 - 14.3. Vinorelbine đối với phụ nữ cho con bú như thế nào?
15. Ảnh hưởng navelbine đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
16. Lưu trữ bảo quản thuốc navelbine như thế nào?
17. Giá thuốc navelbine bao nhiêu?
18. Mua thuốc vinorelbine ở đâu?
 - 18.1. Like this:
 - 18.2. Có liên quan

Thông tin cơ bản thuốc navelbine 30mg vinorelbine



- Tên thương hiệu: **Navelbine**
- Thành phần hoạt chất: **Vinorelbine**
- Hàm lượng: 30mg
- Dạng: Viên nang mềm
- Đóng gói: 1 hộp 1 viên
- Hãng sản xuất: Pierre Fabre

Thuốc navelbine là gì? Thuốc vinorelbine sử dụng để làm gì?

- Thuốc navelbine thuộc về một họ thuốc dùng để điều trị ung thư được gọi là họ vinca-alkaloid.
- Thuốc navelbine điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ
- Điều trị ung thư vú tiến triển mà không đáp ứng với các loại thuốc khác.
- Thuốc không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chỉ định điều trị thuốc navelbine cho ai?

- Điều trị đầu tiên của ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn 3 hoặc 4.
- Việc điều trị ung thư vú tiến triển giai đoạn 3 và 4 tái phát sau hoặc điều trị bằng phác đồ có chứa anthracycline.





Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư vú, ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chống chỉ định điều trị thuốc navelbine với những ai?

- Được biết quá mẫn cảm với vinorelbine hoặc vinca-alkaloids khác hoặc với bất kỳ thành phần nào.
- Bệnh ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thụ
- Phẫu thuật cắt bỏ đáng kể trước đây của dạ dày hoặc ruột non.
- Số lượng bạch cầu trung tính $<1500/mm^3$ hoặc hiện tại nhiễm trùng nặng hoặc gần đây (trong vòng 2 tuần).
- Số lượng tiểu cầu $<100000/mm^3$
- Suy gan nặng
- Mang thai và cho con bú
- Bệnh nhân cần điều trị oxy dài hạn
- Kết hợp với vắc-xin sốt vàng da



Thông tin quan trọng trước khi dùng thuốc navelbine là gì?

Không dùng viên nang mềm thuốc navelbine

- Nếu bạn bị dị ứng (mẫn cảm) với hoạt chất, vinorelbine hoặc bất kỳ thành phần nào khác trong viên nang thuốc navelbine
- Nếu bạn đang mang thai hoặc nghĩ rằng bạn có thể mang thai.
- Nếu bạn đang cho con bú.
- Nếu bạn bị bệnh gan nặng.
- Nếu bạn đã phẫu thuật dạ dày hoặc ruột non, hoặc nếu bạn bị rối loạn đường ruột ảnh hưởng đến cách bạn hấp thụ thức ăn. Những điều này có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn hấp thụ thuốc navelbine
- Nếu bạn có số lượng bạch cầu thấp (bạch cầu trung tính, bạch cầu) hoặc dòng nhiễm trùng nặng hoặc gần đây trong vòng hai tuần.
- Nếu bạn có số lượng tế bào tiểu cầu trong máu thấp (giảm tiểu cầu).
- Nếu bạn dự định tiêm phòng bệnh sốt vàng da hoặc vừa mới tiêm phòng.
- Nếu bạn cần điều trị oxy dài hạn

Chăm sóc đặc biệt khi sử dụng thuốc navelbine ra sao?

Vui lòng thông báo cho bác sĩ của bạn nếu:



- Bạn có tiền sử đau tim hoặc đau ngực dữ dội.
- Khả năng của bạn để thực hiện các hoạt động của cuộc sống hàng ngày bị giảm mạnh.
- Bạn có vấn đề với gan hoặc bạn đã được xạ trị trong lĩnh vực điều trị bao gồm gan.
- Nếu bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi dùng sản phẩm thuốc này.
- Bạn có triệu chứng nhiễm trùng (như sốt, ớn lạnh, đau khớp, ho).
- Bạn đã sử dụng hoặc gần đây đã sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác, kể cả các loại thuốc thu được mà không có đơn thuốc.
- Bạn dự định tiêm phòng hoặc vừa mới tiêm phòng

Liều dùng thuốc **navelbine 30mg** bao nhiêu?



- Trước và trong khi điều trị bằng thuốc navelbine, bác sĩ sẽ kiểm tra số lượng tế bào máu của bạn để xác định khi nào bạn được điều trị và liều nào phù hợp với bạn. Bác sĩ sẽ cho bạn biết hàm lượng của thuốc mà bạn nên dùng. Điều này sẽ phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể của bạn và chiều cao cơ thể.
- Bác sĩ sẽ tính diện tích bề mặt cơ thể của bạn theo mét vuông (m²). Liều hàng tuần thông thường, uống trong một liều duy nhất, là 60mg/m² diện tích bề mặt cơ thể trong 3 liều đầu tiên.
- Sau liều thứ ba, bác sĩ sẽ quyết định xem liều sẽ được tăng lên đến 80mg/m² diện tích bề mặt cơ thể. Trong mọi trường hợp, bác sĩ của bạn có thể điều chỉnh liều của thuốc navelbine.
- Nếu bạn đang dùng thuốc navelbine với một loại thuốc khác để điều trị ung thư bác sĩ sẽ quyết định một liều thích hợp cho bạn
- Tổng liều không bao giờ vượt quá 160mg mỗi tuần.

Nên làm gì khi dùng quá liều thuốc navelbine?

- Nếu bạn đã dùng thêm thuốc navelbine so với liều lượng quy định, hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức. Liều thuốc navelbine của bạn được theo dõi và kiểm tra cẩn thận bởi bác sĩ và dược sĩ của bạn.
- Tuy nhiên, mặc dù bạn sẽ nhận được lượng hóa trị chính xác đôi khi cơ thể bạn có thể phản ứng đưa ra các triệu chứng nghiêm trọng.
- Một số triệu chứng này có thể phát triển như là dấu hiệu của nhiễm trùng (như sốt, ớn lạnh, ho, đau khớp). Bạn cũng có thể bị táo bón nặng.





Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư vú, ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (2)

Nên làm gì khi quên một liều thuốc navelbine?

- Đừng dùng một liều gấp đôi để tạo ra một liều đã quên. Liên hệ với bác sĩ của bạn, người sẽ đưa ra quyết định về việc sắp xếp lại liều của bạn.

Nên làm gì khi muốn ngừng uống thuốc navelbine

- Bác sĩ sẽ quyết định khi nào bạn nên ngừng điều trị. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngăn chặn điều trị sớm hơn, bạn nên thảo luận về các lựa chọn khác với bác sĩ của bạn.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.



Sử dụng thuốc navelbine như thế nào cho đúng?

- Thuốc navelbine nên được đưa ra dưới sự giám sát của bác sĩ có trình độ, người có kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp điều trị ung thư.
- Thuốc navelbine phải được uống bằng miệng.
- Viên nang mềm của thuốc navelbine nên được nuốt cả viên với nước mà không cần nhai hoặc mút viên con nhộng.
- Tốt hơn là nên dùng thuốc navelbine với một bữa ăn nhẹ.
- Không nên uống thuốc navelbine với đồ uống nóng vì nó sẽ làm tan viên nang quá nhanh
- Thuốc navelbine được sử dụng ở những bệnh nhân trên 18 tuổi.
- Thuốc không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi.
- Luôn luôn uống thuốc navelbine chính xác như bác sĩ đã nói với bạn .
- Bạn nên kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn

Thuốc vinorelbine tương tác với thuốc nào?

- Vui lòng thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng, hoặc gần đây đã sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm các loại thuốc thu được mà không cần toa.
- Nếu bạn được cho dùng thuốc navelbine cũng như các loại thuốc ảnh hưởng đến tủy xương của bạn, nó có thể làm cho một số tác dụng phụ tồi tệ hơn.



Bác sĩ của bạn nên đặc biệt chú ý nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau:

- Thuốc dùng để làm loãng máu của bạn (thuốc chống đông máu);
- Một loại thuốc chống động kinh được gọi là phenytoin;
- Thuốc chống nấm như itraconazole và ketoconazole;
- Một loại thuốc chống ung thư được gọi là mitomycin c;
- Các loại thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn như ciclosporin và tacrolimus nhiều loại vắc-xin không được khuyến cáo trong quá trình điều trị.

Tác dụng phụ thuốc navelbine là gì?

- Dấu hiệu của một bệnh nhiễm trùng lớn như ho, sốt và ớn lạnh
- Táo bón nặng với đau bụng khi ruột của bạn không được mở trong vài ngày
- Chóng mặt nghiêm trọng, chóng mặt khi bạn đứng lên
- Đau ngực dữ dội không bình thường với bạn
- Dấu hiệu dị ứng như ngứa, khó thở

Tác dụng phụ rất phổ biến(có thể xảy ra ở hơn 1 trên 10 bệnh nhân được điều trị)



- Cảm thấy ốm (buồn nôn), mất cảm giác ngon miệng (chán ăn)
- Sự sụp đổ của một số tế bào bạch cầu khiến bạn nhiều hơn dễ bị nhiễm trùng. Điều này thường có thể gây ra nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc nấm trong cơ thể bạn (hệ hô hấp, tiết niệu, dạ dày-ruột và có thể khác)
- Giảm hồng cầu có thể làm cho da xanh xao và gây ra yếu đuối hoặc khó thở
- Giảm tiểu cầu trong máu có thể tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím
- Mất một số phản ứng phản xạ, đôi khi khác biệt trong nhận thức của cảm ứng
- Viêm hoặc lở loét trong miệng hoặc cổ họng (viêm miệng)
- Táo bón, tiêu chảy, nếu bạn bị đau bụng hoặc nếu bạn không đi tiêu trong vài ngày
- Rối loạn dạ dày, rụng tóc, mệt mỏi, sốt, khó chịu, giảm cân

Tác dụng phụ thường gặp(có thể xảy ra ở dưới 1 trong 10 bệnh nhân được điều trị)

- Khó ngủ, đau đầu, chóng mặt
- Phản ứng da, ớn lạnh, tăng cân, ho khó thở
- Huyết áp cao với các triệu chứng như đau đầu
- Đau khớp, đau cơ, đau hàm, đau rát và khó đi tiêu
- Một sự khác biệt trong hương vị của bạn về hương vị
- Viêm họng, khó khăn khi nuốt thức ăn hoặc chất lỏng
- Đau ở những vị trí khác nhau trong cơ thể và đau ở khối u
- Sự khác biệt trong thị lực của bạn, xét nghiệm gan bất thường
- Huyết áp thấp với các triệu chứng như chóng mặt hoặc Cảm thấy mờ nhạt



Tác dụng phụ không phổ biến (có thể xảy ra ở hơn 1 trong 100 bệnh nhân được điều trị)

- Ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của bạn như rối loạn thăng bằng (mất điều hòa)
- Ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa của bạn như táo bón nặng với đau bụng khi ruột đã không được mở trong vài ngày (tê liệt hồi tràng)

Ảnh hưởng navelbine đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?

Vinorelbine đối với khả năng sinh sản thế nào?

- Khả năng sinh sản của nam giới: đàn ông được điều trị bằng thuốc navelbine được khuyên không nên làm cha trong khi và tối đa 3 tháng sau khi viên nang cuối cùng.
- Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị và tối đa 3vài tháng sau điều trị.

Vinorelbine đối với phụ nữ mang thai ra sao?

- Không dùng thuốc navelbine nếu bạn đang mang thai, hoặc nghĩ rằng bạn có thể mang thai.
- Nếu bạn phải bắt đầu điều trị bằng thuốc navelbine và bạn đang mang thai, hoặc nếu có thai xảy ra trong quá trình điều trị với thuốc navelbine, không ngừng dùng thuốc navelbine. Ngay lập tức hỏi bác sĩ về những rủi ro tiềm ẩn cho đứa trẻ chưa chào đời




Vinorelbine đối với phụ nữ cho con bú như thế nào?

- Không dùng thuốc navelbine nếu bạn đang cho con bú. Phải ngừng cho con bú nếu cần điều trị bằng thuốc navelbine.
- Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.



Thuốc navelbine 30mg vinorelbine điều trị ung thư vú, ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (3)

Ảnh hưởng navelbine đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?

- Thuốc navelbine không có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc của bạn.
 - Tuy nhiên, một số tác dụng phụ có thể có của thuốc navelbine có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc thực hiện của bạn nhiệm vụ lành nghề
-  • Do đó, bạn không nên lái xe nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc nếu bác sĩ khuyên bạn không nên lái xe.

Lưu trữ bảo quản thuốc navelbine như thế nào?

- Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em
- Không sử dụng thuốc navelbine sau ngày hết hạn được ghi rõ trên vỉ và hộp (sau Exp). Các ngày hết hạn đề cập đến ngày cuối cùng của tháng đó.
- Bảo quản trong tủ lạnh (2°C – 8°C), đừng đóng băng.
- Lưu trữ trong gói ban đầu để bảo vệ từ ánh sáng.
- Thuốc không nên được xử lý thông qua nước thải hoặc chất thải gia đình. Vì lý do an toàn viên nang không sử dụng phải được trả lại cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để tiêu hủy. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Giá thuốc navelbine bao nhiêu?

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc navelbine ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc vinorelbine ở đâu?



- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc navelbine 30mg vinorelbine uy tín trên thị trường.
- Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc navelbine chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

» **Xem thêm thông tin thuốc navelbine 30mg**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-tri-ung-thu>

» **Xem thêm thuốc erlocip 150mg điều trị ung thư phổi**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-erlocip-150mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Navelbine 30mg**

Vinorelbine với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Tham Khảo:

<https://www.drugs.com/mtm/navelbine.html>

(Ngày cập nhật:16-8-2019)

5.0 01



Like this:


Có liên quan



Thuốc alimta 100mg
pemetrexed điều trị
ung thư phổi
16/08/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc gefinat
250mg gefitinib điều
trị ung thư phổi
20/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc iressa 250mg
gefitinib
19/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"

