

الحيوانات البرية المصرية Connochaetes التيتل



الاسم العلمي: Connochaetes أو ما يعرف أيضاً بالتيتل الأفريقي جنس من فصيلة البقریات. حيوان مميز الشكل، حيث يجمع بين رأس وقرني الثور، ووجه البقرة، وذيل وشعر الحصان، كما يصدر صوت يشبه صوت ضفدع ضخمة. يصل طول النوح حتى متر ونصف تقريباً كما يزن أكثر من ٢٧٤ كيلوجراماً، يقل وزن الأنثى قليلاً حيث يصل إلى ٢٣٠ كيلوجراماً. يغطي جسم النوح جلد سميك أملس ناعم يتدرج لونه من البني الداكن اللامع حتى الأسود، كما تتدلى أسفل الذقن لحية بيضاء من خصلات الشعر، وتوجد حيوانات منه ذات لحية سوداء. له زوج من القرون المقوسة ذات سطح أملس وأذنان طويلتان وذيل أسود طويل يصل طوله إلى الأرض تقريباً.

الفنك أصغر أنواع فصيلة الكلبيات جميعا



الاسم العلمي "Vulpes zerda"، بينما الآخر يصنفه على أنه يشكل جنسا خاصا به هو جنس الفنك ويكون اسمه العلمي بالتالي "Fennecus zerda"، وكان على شفير الإنقارض قبل قرون ليدة بسبب غلاوة فروه الناعم الفنك هو أصغر الكلبيات، فوزنه لا يزيد على ١.٥ كيلو غرامات، ويصل ارتفاعه عند الكتفين إلى ٢٠ سنتيمترا، ويبلغ طول جسده حوالي ٤٠ سنتيمتر، وذيله قرابة ٢٥ سنتيمتر، أما الأذنين فيمكن أن يصل طولهما إلى ١٥ سنتيمترا. يكون لون الفنك رمليًا في العادة مما يساعده على التمويه في محيطه الصحراوي.

تعتبر أذان الفنك الأكبر حجما في فصيلة الكلبيات، وهي تساعده على التخلص من الحرارة الفائضة عبر تبريد جسده بواسطة تمرير الدم عبر الأوعية الدموية الكثيرة الموجودة فيها، كما وتساعده على سماع حركة طريدته أثناء الليل، وهذه الأذان حساسة للأصوات بدرجة كبيرة حيث أن الفنك يستطيع أن يسمع أصوات الحشرات الكبيرة كالخنافس والجراد وهي تدبّ على

الرمال. يقوم معطف هذه الحيوانات بعكس أشعة الشمس أثناء النهار وحفظ الحرارة خلال الليل، ولهذه الثعالب فراء سميك على باطن قوائمها ليحميها من الرمال الحارقة أثناء تنقلها.

الضَبُعُ أو العَرَفَاء



(الاسم العلمي: *Hyaena hyaena*) هو حيوان من فصيلة الضبعيات التي . لضباع المخططة حيوانات قمامة أو كاسحة أي أنها تقتات على الجيفة معظم الوقت، إلا أنها قد تصطاد الثدييات الصغيرة أيضا كما وتقتات على الفاكهة والحشرات، ويعرف عن السلالات الأكبر حجما أنها تصطاد طرائد بحجم الخنزير البري. تعتبر هذه الحيوانات رحالة، تصطاد الضباع المخططة بشكل فردي إلا أنها تتجمع في مجموعات عائلية صغيرة، فهي تنتقل بين مصادر الماء واحدة تلو الأخرى إلا أنها لا تبتعد أكثر من ١٠ كيلومترات والإناث بين ٢٦ و ٣٤ كيلوغراما، ويبلغ طول هذه الحيوانات من رأسها إلى ذيلها ما بين متر و ١.١٥ متر أما ارتفاعها عند الكتفين فيبلغ ما بين ٦٦ و ٧٥ سنتيميرا

غزال الجبل أو الغزال الجبلي



(الاسم العلمي: *Gazella gazella*) يعتبر غزال الجبل أنحف الغزلان بنيةً وأطولها قوائمًا و عنقاً. يتراوح لون كسوة هذه الحيوانات من الأسمر إلى البني الداكن على ظهره، عنقه، ورأسه

تعيش هذه الغزلان في مجموعات صغيرة يتراوح عدد أفرادها من ٣ إلى ٨، وأحياناً أكثر بقليل. تتألف التركيبة الاجتماعية من ذكور مناطقية انعزالية، تبقى في منطقة خاصة بها وتحميها من باقي الذكور طيلة أيام العام؛ بالإضافة لمجموعات دائمة أو مؤقتة من الإناث وصغارها؛ وأخيراً قطعان صغيرة

الأفعى المقرنة



(الإسم العلمي: Cerastes)،

هي من الأفاعي الصغيرة، بمتوسط طول ٥٠ سم (٢٠ بوصة) تقريباً بحساب الجسم والذيل، لديها ما يُشبه القرون فوق عينيها، وهي عريضة الجسم والرأس، قصيرة الذيل، دقيقة الرقبة، وعلى جانبي الرأس العريض توجد غدد السم التي ساهمت في زيادة حجم الرأس. وإذا حوصرت الأفعى التفتت حول نفسها وحكت حراشفها ببعض لتصدر صوتاً يسمى الكشيش، لتفزع أعدائها.

للأفعى القرناء نابان أماميان متحركان، وتستطيع الأفعى تحريك هذان النابان إلى الأمام خارج الفم وإلى الداخل لتدخلهما في لثتها، وهذان النابان يساعدها على سرعة توصيل السم للفريسة. قرنا الأفعى جلديين ناعمين مرنين، يمكن بسهولة ثنيهما، ولا يعتبران سلاحاً تستطيع استخدامه، بينما تستطيع به إفزاع أعدائها، وقد يكونان لحماية عينيها الكبيرتين من الصدمات.

أرنب الجبل البري



(الإسم العلمي: Lepus timidus) أو القوواع الجبلي أو القوواع الأزرق، هو نوع من الثدييات يتبع فصيلة الأرانب ضمن رتبة الأرنبيات.

الثعلب الأحمر



(الاسم العلمي: Vulpes vulpes) حيوان من الثعالب ينتمي إلى رتبة آكلات اللحوم وفصيلة الكلبيات، وهو يعرف أيضا بمجرد الثعلب بما أنه أكثر أنواع الثعالب شيوعا

القتفد المصري ويتميز بطول الأذنين

Auritus Hedgehog



الاسم العلمي Erinaceinae

القنفذ طويل الأذن: هذا الحيوان الليلي ليس بقنفذ صحراء حقيقي يُشاهد في الصحراء الساحلية ، وقد يحفر في بعض الأحيان حُفرة سطحية ، لكنه يتواجد في مُعظم الأحيان في المباني والكهوف الصغيرة ، أو حُفر حيوانات أخرى ، ويعتمد في غذائه بشكل كبير على الحشرات والفقاريات الصغيرة.

القنفذ من الحيوانات الليلية ينشط ليلا و يبدأ الخروج من جحوره و أماكن اختفائه عند وقت الغروب

كان قديما ينتشر القنفذ في كثير من الأراضي الزراعية خاصة بدلتا مصر و لكن نتيجة للاعتماد على المبيدات الحشرية في القضاء على الحشرات و الآفات الزراعية تقلصت أعداده بصورة كبيرة و أيضا لا ننسى الصيد الجائر له لبيعة كحيوان أليف .

أماكن تواجده\ المناطق الزراعية بجوار الترع و المصارف وحدائق الفاكهة و الصحارى الآن يتركز بشمال سيناء.

اليربوع المصري



(الاسم العلمي: *Jaculus jaculus*) هو قارض صغير نظامه الغذائي يتكون من الأعشاب والبذور، أما حاجياته للماء للبقاء

على قيد الحياة قليلة جدا. اليربوع وهو من أجمل القوارض في
الصحراء

ثعبان أبو السيور الجبلي (الهرسين)



الاسم العلمي: *Psammophis aegyptius*

ثعبان أبو السيور الجبلي الهرسين (saharan sand)

الهارسين هو ثعبان طويل نحيل يصل إلى ١٥٠ سم ، يتواجد في الصحراء ، في الأماكن القليلة الخضرة غالبًا ، ويتضح أن هذا الثعبان قد وجد تقريبًا في جميع المواطن في مصر ما عدا شمال سيناء ، وغذاؤه الأساسي الطيور الصغيرة ، ينشط أثناء اليوم والمساء وأيضًا في ساعات الليل المتأخرة .

تخرج الثعابين للتزاوج ووضع البيض يتم وضع البيض بشق صخري أو بحفرة و تتولى الشمس مهمة الحضانة وتخرج الثعابين بعد ٢٥ يوم.

الورل الصحراوي



الاسم العلمي: *Varanus griseus* عادةً ما تكون ألوان جسد الورل الصحراوي متنوّعة وكثيرة، فتتراوح من البني الفاتح والأصفر إلى الرماديّ. يبلغ متوسط طوله نحو متر واحد، إلا أنّه قد يصل في بعض الحالات إلى مترين تقريباً. وتقطع جسده في الكثير من الأحيان خطوطاً أفقية غامقة على ظهر وذيله، كما تنتشر على ظهره بعض البقع الصفراء. وأما الصغار فيكون لون جسدهم برتقالياً فاقعاً تقطعه خطوط أيضاً، وربّما تختفي هذه الخطوط عند بلوغهم. فتحات المنخر عند الورل الصحراوي تقع عالياً في الوجه، أقرب إلى العينين منها إلى الخطم. يعتمد حجم هذه الزواحف على إمكانية حصولها على الطّعام،

أن مصر تحتوي بيئة برية مميزة قلما اهتم بها السكان المحليون برغم ما تحتويه من طبيعة جميلة وحياة ساحرة.