

Thuốc afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú

Bởi **admin** - 20/12/2017



Thuốc afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú - Thuốc đặc trị 247

Thuốc **Afinitor 10mg Everolimus** điều trị ung thư vú hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247** ☎ ~~0901-771-516~~ chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Thuốc afinitor được tin tưởng lựa chọn là liệu pháp hỗ trợ điều trị ung thư vú hiệu quả. Người bệnh cần tuân thủ các khuyến cáo từ bác sĩ để tránh các trường hợp mẫn cảm và tác dụng phụ của thuốc. Mua thuốc tại các nhà cung cấp thuốc uy tín trên thị trường. Thuốc đặc trị 247 là đơn vị cung cấp thuốc Afinitor chính hãng, được ủy quyền và có kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn khách hàng sử dụng thuốc đúng cách.



Nội Dung Bài Viết



1. Thuốc Afinitor 10mg Everolimus là gì?
2. Thông tin cơ bản thuốc Afinitor 10mg Everolimus
3. Tôi nên dùng thuốc Afinitor như thế nào?
4. Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?
5. Điều gì xảy ra nếu tôi quá liều?
6. Tôi nên tránh những gì khi dùng thuốc Afinitor?
7. Một số lưu ý trước khi dùng thuốc Afinitor 10mg Everolimus
8. Tác dụng phụ của thuốc Afinitor
 - 8.1. Những điều quan trọng cần nhớ về tác dụng phụ của thuốc Everolimus:
 - 8.2. Các tác dụng phụ sau đây là phổ biến (xảy ra hơn 30%):
 - 8.3. Xét nghiệm máu bất thường bao gồm:
 - 8.4. Đây là những tác dụng phụ ít gặp hơn (xảy ra trong 10-29%):
9. Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Afinitor?
10. Ảnh hưởng của thuốc Afinitor đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
 - 10.1. Về khả năng sinh sản
 - 10.2. Về phụ nữ có khả năng sinh con và tránh thai ở nam và nữ
 - 10.3. Về mang thai
 - 10.4. Về cho con bú
11. Một số mẹo tự chăm sóc
12. Ảnh hưởng của thuốc Afinitor đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
13. Thuốc Afinitor 10mg Everolimus mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 13.1. Like this:
 - 13.2. Có liên quan

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus là gì?

Thuốc Afinitor (everolimus) là một loại thuốc trị ung thư can thiệp vào sự phát triển của các tế bào ung thư và làm chậm sự lây lan của chúng trong cơ thể.

Thuốc Afinitor được sử dụng để điều trị một số loại ung thư thận, ung thư vú hoặc khối u não. Thuốc cũng được sử dụng để điều trị một số loại khối u tiên tiến hoặc tiến triển của dạ dày, ruột hoặc tuyến tụy.



Thuốc Afinitor cũng được sử dụng để điều trị một số loại động kinh hoặc khối u không ung thư (lành tính) ở não hoặc thận ở những người mắc bệnh di truyền gọi là phức tạp xơ cứng củ .



Thuốc afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú – Thuốc đặc trị 247 (1)

Thông tin cơ bản thuốc **Afinitor 10mg Everolimus**

- Tên thương hiệu: **Afinitor**
- Thành phần hoạt chất: **Everolimus**
- Hãng sản xuất: Novartis
- Hàm lượng: 10mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 30viên nén

Giá Thuốc Afinitor : Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage [Thuốc Đặc Trị 247](#)



Tôi nên dùng thuốc Afinitor như thế nào?

- Dùng thuốc Afinitor chính xác theo quy định của bác sĩ. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn và đọc tất cả các hướng dẫn thuốc hoặc tờ hướng dẫn. Bác sĩ của bạn đôi khi có thể thay đổi liều của bạn. Sử dụng thuốc chính xác theo chỉ dẫn.
- Dùng thuốc Afinitor cùng một lúc mỗi ngày. Bạn có thể dùng thuốc có hoặc không có thức ăn, nhưng uống theo cùng một cách mỗi lần.
- Đọc và cẩn thận làm theo bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào được cung cấp cùng với thuốc của bạn. Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không hiểu những hướng dẫn này.
- Thuốc Afinitor có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc nhiễm trùng bằng cách thay đổi cách hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động. Bạn sẽ cần xét nghiệm y tế thường xuyên.
- Nếu bạn đã từng bị viêm gan B, sử dụng thuốc Afinitor có thể khiến vi-rút này hoạt động hoặc trở nên tồi tệ hơn.
- Nếu bạn cần phẫu thuật, hãy báo cho bác sĩ phẫu thuật trước thời hạn rằng bạn đang sử dụng thuốc Afinitor. Các vết mổ phẫu thuật của bạn hoặc các vết thương khác có thể mất nhiều thời gian hơn để chữa lành trong khi bạn đang dùng thuốc.
- Lưu trữ ở nhiệt độ phòng trong thùng chứa ban đầu, tránh xa độ ẩm, nhiệt và ánh sáng. Giữ các viên thuốc phân tán không sử dụng trong gói vỉ giấy bạc.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?

- Sử dụng thuốc càng sớm càng tốt, nhưng bỏ qua liều đã quên nếu bạn trễ hơn 6 giờ cho liều.
- Không sử dụng hai liều cùng một lúc.



Điều gì xảy ra nếu tôi quá liều?

- Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp

Tôi nên tránh những gì khi dùng thuốc Afinitor?

- Không nhận vắc-xin “sống” trong khi sử dụng thuốc Afinitor và tránh tiếp xúc với bất kỳ ai gần đây đã nhận được vắc-xin sống. Có khả năng virus có thể truyền sang bạn. Vắc-xin sống bao gồm sởi, quai bị, rubella (MMR), bại liệt, rotavirus, thương hàn, sốt vàng da, thủy đậu (thủy đậu) và zoster (bệnh zona).
- Bưởi có thể tương tác với thuốc Everolimus và dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn. Tránh sử dụng các sản phẩm bưởi.
- Nếu bạn bị loét miệng tránh sử dụng nước súc miệng hoặc bôi thuốc có chứa cồn, peroxide, iốt hoặc húng tây. Bác sĩ có thể kê toa nước súc miệng steroid nếu vết loét miệng nghiêm trọng.
- Thuốc có thể truyền vào dịch cơ thể (nước tiểu, phân, chất nôn). Người chăm sóc nên đeo găng tay cao su trong khi làm sạch chất lỏng cơ thể của bệnh nhân, xử lý rác bẩn hoặc đồ giặt hoặc thay tã. Rửa tay trước và sau khi tháo găng tay. Giặt quần áo bẩn và khăn trải riêng biệt với đồ giặt khác.

Một số lưu ý trước khi dùng thuốc Afinitor 10mg Everolimus

Bạn không nên sử dụng thuốc Afinitor nếu bạn bị dị ứng với everolimus, sirolimus (Rapamune) hoặc temsirolimus (Torisel).

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có:



- Nhiễm trùng hoạt động hoặc mãn tính
- Bệnh gan , đặc biệt là viêm gan B
- Bệnh thận
- Tiểu đường hoặc đường huyết cao
- Cholesterol cao
- Nếu bạn được lên lịch để nhận bất kỳ vắc-xin
- Huyết áp cao


Cả nam giới và phụ nữ sử dụng thuốc Afinitor nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả để tránh thai. Thuốc Everolimus có thể gây hại cho thai nhi hoặc gây dị tật bẩm sinh nếu mẹ hoặc cha đang sử dụng thuốc.

Nếu bạn là phụ nữ, hãy tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai trong ít nhất 8 tuần sau liều thuốc Afinitor cuối cùng của bạn. Nếu bạn là đàn ông, hãy tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai trong ít nhất 4 tuần sau liều cuối cùng của bạn. Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu có thai xảy ra trong khi người mẹ hoặc người cha đang sử dụng thuốc Afinitor.

Thuốc Afinitor có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng biện pháp tránh thai để tránh thai vì thuốc Everolimus có thể gây hại cho em bé nếu có thai.

Bạn không nên cho con bú trong khi sử dụng thuốc và trong ít nhất 2 tuần sau liều cuối cùng của bạn.





Thuốc afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú – Thuốc đặc trị 247 (2)

Tác dụng phụ của thuốc Afinitor

Những điều quan trọng cần nhớ về tác dụng phụ của thuốc Everolimus:

- Bạn sẽ không nhận được tất cả các tác dụng phụ thuốc Everolimus được đề cập dưới đây.
- Tác dụng phụ của thuốc Everolimus thường có thể dự đoán được về khởi phát, thời gian và mức độ nghiêm trọng của chúng.
- Tác dụng phụ của thuốc Everolimus hầu như luôn hồi phục và sẽ biến mất sau khi trị liệu hoàn tất.
- Tác dụng phụ của thuốc Everolimus có thể khá dễ quản lý. Có thể có các lựa chọn để giảm thiểu hoặc ngăn chặn chúng.

Các tác dụng phụ sau đây là phổ biến (xảy ra hơn 30%):



- Loét miệng, viêm niêm mạc, viêm miệng hoặc viêm thực quản
- Nhiễm trùng, người mệt mỏi, sung hoặc phù
- Phát ban, ngứa hoặc khô da, bị sốt
- Bệnh tiêu chảy, đau dạ dày hoặc chuột rút
- Buồn nôn, nôn hoặc đau dạ dày
- Yếu hoặc suy nhược, đau đầu

Xét nghiệm máu bất thường bao gồm:

- Tăng cholesterol máu
- Triglyceride cao hoặc tăng triglyceride máu
- Lượng đường trong máu cao hoặc tăng đường huyết
- Canxi hoặc hạ canxi máu thấp
- Phosphate thấp hoặc giảm phosphat máu
- Công thức máu thấp
- Vấn đề về gan hoặc men gan tăng cao
- Vấn đề về thận hoặc tăng creatinine huyết thanh

Đây là những tác dụng phụ ít gặp hơn (xảy ra trong 10-29%):

- Thiếu thèm ăn, ho
- Khó thở hoặc khó thở
- Huyết áp cao hoặc tăng huyết áp
- Vấn đề chảy máu
- Đau khớp hoặc đau khớp
- Đau cơ hoặc đau cơ
- Mất khả năng sinh sản, hoặc khả năng thụ thai hoặc làm cha của một đứa trẻ. Thảo luận về vấn đề này với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn.



Không phải tất cả các tác dụng phụ được liệt kê ở trên. Các tác dụng phụ rất hiếm gặp – xảy ra ở dưới 10% bệnh nhân – không được liệt kê ở

đây. Nhưng bạn nên luôn luôn thông báo cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường.

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến thuốc Afinitor?

Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc hiện tại của bạn. Nhiều loại thuốc có thể tương tác với thuốc Everolimus, đặc biệt là:

- Một loại thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống nấm
- Thuốc điều trị bệnh tim hoặc huyết áp
- Thuốc điều trị viêm gan C, hoặc hiv/aids
- Thuốc động kinh
- Thuốc trị lao phổi
- Các loại thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch, như thuốc trị ung thư, steroid và thuốc để ngăn ngừa thải ghép nội tạng.

Danh sách này không đầy đủ và nhiều loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc Everolimus. Điều này bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược . Không phải tất cả các tương tác thuốc có thể được liệt kê ở đây.

Ảnh hưởng của thuốc Afinitor đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Về khả năng sinh sản



- Tuy nhiên, khả năng thuốc Everolimus gây vô sinh ở bệnh nhân nam và nữ vẫn chưa được biết, tuy nhiên vô kinh (vô kinh thứ phát và các bất thường kinh nguyệt khác) và mất cân bằng hormone kích thích nang trứng (LH) / hormone kích thích nang trứng (FSH) đã được quan sát thấy ở bệnh nhân nữ.
- Dựa trên những phát hiện phi lâm sàng, khả năng sinh sản của nam và nữ có thể bị tổn hại khi điều trị bằng thuốc Everolimus

Về phụ nữ có khả năng sinh con và tránh thai ở nam và nữ

- Phụ nữ có khả năng sinh con phải sử dụng một biện pháp tránh thai có hiệu quả cao (ví dụ như uống, tiêm hoặc cấy ghép phương pháp ngừa thai không chứa estrogen, ngừa thai dựa trên progesterone, cắt tử cung, thắt ống dẫn trứng, kiêng hoàn toàn IUD], hoặc triệt sản nữ / nam) trong khi nhận được thuốc Everolimus, và trong tối đa 8 tuần sau khi kết thúc điều trị.

Về mang thai

- Không có dữ liệu đầy đủ từ việc sử dụng thuốc Everolimus ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy tác dụng độc tính sinh sản bao gồm độc tính phôi và độc tính thai. Những nguy cơ tiềm ẩn cho con người là không xác định.
- Thuốc Everolimus không được khuyến cáo trong thai kỳ và ở phụ nữ có khả năng sinh con không sử dụng biện pháp tránh thai.

Về cho con bú



- Người ta không biết liệu thuốc Everolimus được bài tiết qua sữa mẹ. Tuy nhiên, ở chuột, thuốc Everolimus hoặc chất chuyển hóa của nó dễ dàng truyền vào sữa.
- Phụ nữ dùng thuốc Everolimus không nên cho con bú trong khi điều trị và trong 2 tuần sau liều cuối cùng.



Thuốc afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú - Thuốc đặc trị 247 (3)

Một số mẹo tự chăm sóc



- Uống ít nhất 2-3 lít nước mỗi 24 giờ, trừ khi bạn được hướng dẫn khác.
- Sử dụng dao cạo điện và bàn chải đánh răng mềm để giảm thiểu chảy máu.
- Tránh các môn thể thao hoặc hoạt động liên lạc có thể gây thương tích.
- Để giảm buồn nôn, dùng thuốc chống buồn nôn theo quy định của bác sĩ, và ăn các bữa ăn nhỏ, thường xuyên.
- Tránh phơi nắng. Mặc quần áo chống nắng và chống nắng SPF 30 (hoặc cao hơn).
- Nói chung, uống đồ uống có cồn nên được giữ ở mức tối thiểu hoặc tránh hoàn toàn. Bạn nên thảo luận với bác sĩ của bạn.
- Nghỉ ngơi nhiều, duy trì dinh dưỡng tốt, rửa tay thường xuyên.

Ảnh hưởng của thuốc Afinitor đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Thuốc Afinitor có thể ảnh hưởng nhỏ hoặc vừa phải đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.
- Bệnh nhân nên được thận trọng khi lái xe hoặc sử dụng máy móc nếu họ cảm thấy mệt mỏi trong khi điều trị với thuốc Afinitor.

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp). Mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà Nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.



» Xem thêm thông tin thuốc afinitor

<https://thuocdactri247.com/ho-tro-dieu-tri-ung-thu-vu-hieu-qua->

[voi-thuoc-afinitor/](#)

» Xem thêm thuốc tykerb điều trị ung thư vú

<https://thuocdactri247.com/thuoc-tykerb-250mg-lapatinib-dieu-tri-ung-thu-vu/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Afinitor 10mg Everolimus** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: **Thuốc Đặc Trị 247**


5.0 77 ★★★★★

Like this:


Có liên quan



~~Thuốc lenvima 10mg
lenvatinib trị ung thư
gan thận
17/05/2019
In "Thuốc điều trị ung
thư thận"~~



~~Thuốc aromasin 25mg
exemestane điều trị
ung thư vú
17/07/2017
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"~~



~~Thuốc tykerb 250mg
lapatinib điều trị ung
thư vú
21/05/2019
In "Thuốc điều trị ung
thư vú"~~

