

Faits historiques exposant les dangers et l'inefficacité des vaccins

[26 avril 2021]

Quelques faits historiques sur la vaccination

1871-2

L'Angleterre, avec 98% de la population âgée de 2 à 50 ans **vaccinée** contre la variole, a connu sa **pire épidémie de variole** avec 45 000 décès.

Au cours de la même période en Allemagne, avec un taux de vaccination de 96%, il y a eu plus de 125 000 décès dus à la variole.

([Les documents Hadwen](#))

1940 et 1945

En Allemagne, la **vaccination de masse obligatoire** contre la **diphtérie** a commencé en 1940 et en 1945.

Les cas de diphtérie sont passés de 40 000 à 250 000.

(Don't Get Stuck, Hannah Allen)

1960

Aux États-Unis, deux virologues ont découvert que **deux vaccins antipoliomyélitiques** étaient **contaminés** par le **virus SV 40**, qui cause le cancer chez les animaux ainsi que des changements dans les cultures de tissus des cellules humaines.

Des millions d'enfants ont reçu des injections de ces vaccins.

([Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555 – Vaccin antipoliomyélitique et contamination par le SV40, Département de la Santé Gouvernement australien / PDF](#))

1967

Le Ghana a été déclaré indemne de **rougeole** par l'Organisation mondiale de la santé après que 96% de sa population a été vaccinée.

En 1972, le Ghana a connu l'**une de ses pires flambées de rougeole** avec son **taux de mortalité le plus élevé** et jamais enregistré.

(Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990)

1970 et 1990

Au Royaume-Uni, entre 1970 et 1990, plus de 200 000 cas de **coqueluche** sont survenus chez des enfants entièrement vaccinés.

(Community Disease Surveillance Center, Royaume-Uni)

Années 1970

Un essai de vaccin antituberculeux en Inde, auprès de 260 000 personnes, a révélé que plus de cas de tuberculose se produisaient chez les vaccinés que chez les non vaccinés.

(The Lancet 12/1/80 p73)

1977

Le Dr Jonas Salk, qui a mis au point le premier vaccin antipoliomyélitique, a témoigné avec d'autres scientifiques que l'inoculation massive contre la polio était la cause de la plupart des cas de polio aux États-Unis depuis 1961.

(Science 4/4/77 "Abstracts")

1978

Une enquête menée dans 30 États des États-Unis a révélé que plus de la moitié des enfants qui ont contracté la rougeole ont été correctement vaccinés.

(The People's Doctor – Le médecin du peuple – Dr R Mendelsohn)

1979

En 1979, la Suède a abandonné le vaccin contre la coqueluche en raison de son inefficacité.

Sur 5 140 cas en 1978, il a été constaté que 84% avaient été vaccinés trois fois!

(BMJ 283:696-697, 1981)

1981

Le numéro de février 1981 du Journal of the American Medical Association a révélé que 90% des obstétriciens et 66% des pédiatres refusaient de se faire vacciner contre la rubéole.

1982 et 1987

Aux États-Unis, le coût d'une seule injection de DTC est passé de 11 cents en 1982 à 11,40 \$ en 1987.

Les fabricants du vaccin mettaient de côté 8 \$ par injection, pour couvrir les frais juridiques et les dommages, qu'ils payaient aux parents d'enfants atteints de lésions cérébrales et aux enfants décédés après la vaccination.

(The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld)

1988 et 1989

À Oman, une épidémie de poliomyélite s'est déclarée parmi des milliers d'enfants entièrement vaccinés.

La région avec le taux d'attaque le plus élevé avait la couverture vaccinale la plus élevée.

La région avec le taux d'attaque le plus bas avait la plus faible couverture vaccinale.

(The Lancet, 21/9/91)

1990

Une enquête, menée au Royaume-Uni auprès de 598 médecins, a révélé que plus de 50% d'entre eux refusaient de se faire vacciner contre l'hépatite B; malgré le fait qu'ils appartenaient au groupe à haut risque appelé à se faire vacciner.

(British Med Jnl, 27/1/1990)

1990

Le Journal of the American Medical Association publiait un article sur la rougeole déclarant, ce qui suit.

“Bien que plus de 95% des enfants d'âge scolaire aux États-Unis soient vaccinés contre la rougeole, de grandes flambées de rougeole continuent de se produire dans les écoles; et dans la plupart des cas, ils se produisent parmi les enfants déjà vaccinés.”

(JAMA, 21/11/90)

1990 et 1993

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration [FDA] des États-Unis a dénombré au total 54 072 effets indésirables suite à la vaccination.

La FDA a admis, que ce nombre ne représentait que 10% du total réel, car la plupart des médecins refusaient de signaler les blessures dues aux vaccins.

En d'autres termes, les effets indésirables sur cette période ont dépassé le demi-million!

(National Vaccine Information Centre, March 2, 1994)

1994

Dans le numéro de juillet 1994 du New England Journal of Medicine, une étude a révélé que plus de 80% des enfants de moins de 5 ans qui ont contracté la coqueluche ont été entièrement vaccinés.

2000

Le 2 novembre 2000, l'Association des médecins et de chirurgiens américains (AAPS) a annoncé que ses membres ont voté, lors de leur 57e réunion annuelle à St Louis, pour l'adoption d'une résolution appelant à la fin des vaccins obligatoires pour les enfants.

La résolution a été adoptée à l'unanimité (pas un seul «non»).

(Rapport de Michael Devitt, *'Un groupe de médecins demande la fin des vaccins obligatoires'* – [Le rapport](#))

Source

bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas23.htm

HISTORICAL FACTS EXPOSING THE DANGERS AND INEFFECTIVENESS OF VACCINES