

Εμβολιασμός και νόσηση από κορωνοϊό (5-17 ετών)

*Οδηγίες για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων ηλικίας 5
έως 17 ετών μετά από νόσηση από κορωνοϊό*




Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Εμβολιασμός & νόσηση (5-17 ετών)

Περίπτωση 1^η



Νόσηση πριν τον εμβολιασμό



Συστήνεται βασικός εμβολιασμός (δύο δόσεις) 1 έως 3 μήνες μετά τη διάγνωση της νόσου




Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δε συστήνει τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης

Περίπτωση 2^η



1^η δόση εμβολίου




Νόσηση μετά την 1^η δόση



Συστήνεται ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού με μια δόση 1 έως 3 μήνες μετά τη διάγνωση της νόσου

Εμβολιασμός & νόσηση (5-17 ετών)

Περίπτωση 3^η



Βασικός εμβολιασμός με δύο δόσεις



Νόσηση μετά τον εμβολιασμό



Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δε συστήνει τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού