

Thuốc alimta 100mg pemetrexed điều trị ung thư phổi

Bởi Đức thành Không - 16/08/2019



Thuốc alimta 100mg pemetrexed điều trị ung thư phổi - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Alimta 100mg Pemetrexed điều trị ung thư phổi hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc alimta 100mg pemetrexed
2. Thuốc alimta là gì? Thuốc pemetrexed sử dụng làm gì?
3. Chỉ định điều trị thuốc alimta 100mg
 - 3.1. U trung biểu mô màng phổi ác tính
 - 3.2. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ
4. Chống chỉ định điều trị thuốc alimta 100mg
5. Thông tin quan trọng trước khi dùng thuốc alimta
 - 5.1. Không sử dụng thuốc alimta
 - 5.2. Cảnh báo và đề phòng
6. Liều dùng thuốc alimta 100mg bao nhiêu?
 - 6.1. Liều dùng và lịch trình khuyến nghị cho NSCLC không vảy
 - 6.2. Liều dùng khuyến nghị và lịch trình cho U trung biểu mô
7. Cách sử dụng thuốc alimta như thế nào cho đúng?
8. Thuốc pemetrexed tương tác với thuốc nào?
9. Tác dụng phụ thuốc alimta là gì?
 - 9.1. Rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)
 - 9.2. Thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)
 - 9.3. Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 100 người)
 - 9.4. Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1.000 người)
10. Ảnh hưởng alimta đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?
 - 10.1. Navelbine đối với khả năng sinh sản
 - 10.2. Navelbine đối với phụ nữ mang thai
 - 10.3. Navelbine đối với phụ nữ cho con bú
11. Ảnh hưởng alimta đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
12. Lưu trữ bảo quản thuốc alimta thế nào?
13. Giá thuốc alimta bao nhiêu?
14. Mua thuốc pemetrexed ở đâu?
 - 14.1. Like this:
 - 14.2. Có liên quan

Thông tin cơ bản thuốc alimta 100mg pemetrexed



- Tên thương hiệu: **Alimta**
- Thành phần hoạt chất: **Pemetrexed**
- Hàm lượng: 100mg
- Dạng: Dịch tiêm truyền cô đặc
- Đóng gói: 1 lọ 100mg dịch tiêm truyền
- Hãng sản xuất: Lilly

Thuốc alimta là gì? Thuốc pemetrexed sử dụng làm gì?

- Thuốc alimta là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị ung thư.
- Thuốc alimta được dùng kết hợp với cisplatin, một loại thuốc chống ung thư khác để điều trị trung biểu mô màng phổi ác tính, một dạng ung thư ảnh hưởng đến niêm mạc phổi cho bệnh nhân chưa nhận được hóa trị liệu trước đó.
- Thuốc alimta cũng được dùng kết hợp với cisplatin để điều trị ban đầu cho bệnh nhân giai đoạn tiến triển của ung thư phổi.
- Thuốc alimta có thể được kê toa cho bạn nếu bạn bị ung thư phổi ở giai đoạn tiến triển nếu bệnh của bạn có đáp ứng với điều trị hoặc nó vẫn không thay đổi nhiều sau khi hóa trị liệu ban đầu.
- Thuốc alimta cũng là một phương pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến triển sau khi hóa trị ban đầu khác đã được sử dụng.





Thuốc alimta 100mg pemetrexed điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chỉ định điều trị thuốc **alimta 100mg**

U trung biểu mô màng phổi ác tính

- Thuốc alimta kết hợp với cisplatin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân hóa trị liệu với u trung biểu mô màng phổi ác tính không thể cắt bỏ.

Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ



- Thuốc alimta kết hợp với cisplatin được chỉ định trong điều trị đầu tiên ở bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển cục bộ hoặc di căn khác với mô học tế bào vảy chủ yếu.
- Thuốc alimta được chỉ định là đơn trị liệu để điều trị duy trì ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển cục bộ hoặc di căn khác với mô học tế bào vảy chủ yếu ở những bệnh nhân không tiến triển ngay sau hóa trị liệu bằng bạch kim.
- Thuốc alimta được chỉ định là đơn trị liệu trong điều trị dòng thứ hai cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển cục bộ hoặc di căn khác với mô học tế bào vảy chủ yếu.

Chống chỉ định điều trị thuốc alimta 100mg

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược của thuốc.
- Cho con bú
- Vắc-xin sốt vàng đồng thời

Thông tin quan trọng trước khi dùng thuốc alimta

Không sử dụng thuốc alimta



- Nếu bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với thuốc pemetrexed hoặc bất kỳ thành phần nào khác của điều này thuốc.
- Nếu bạn đang cho con bú; bạn phải ngừng cho con bú trong khi điều trị bằng thuốc alimta.
- Nếu gần đây bạn đã nhận được hoặc sắp được chủng ngừa bệnh sốt vàng da.

Cảnh báo và đề phòng



- Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi nhận thuốc alimta.
- Nếu bạn hiện đang có hoặc đã có vấn đề với thận, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn hoặc dược sĩ bệnh viện vì bạn không thể dùng thuốc alimta.
- Trước mỗi lần tiêm truyền, bạn sẽ lấy mẫu máu của mình để đánh giá xem bạn có đủ không chức năng thận và gan để kiểm tra xem bạn có đủ tế bào máu để dùng thuốc alimta không.
- Bác sĩ của bạn có thể quyết định thay đổi liều hoặc trì hoãn điều trị cho bạn tùy thuộc vào tình trạng chung của bạn và nếu số lượng tế bào máu của bạn quá thấp. Nếu bạn cũng đang nhận được cisplatin, bác sĩ sẽ đảm bảo rằng bạn được ngâm nước đúng cách và được điều trị thích hợp trước và sau khi nhận được cisplatin ngăn ngừa nôn mửa.
- Nếu bạn đã hoặc sắp điều trị bằng xạ trị, xin vui lòng cho bác sĩ biết vì có thể có sớm hoặc phản ứng bức xạ muộn với thuốc alimta.
- Nếu bạn đã được tiêm phòng gần đây, xin vui lòng cho bác sĩ của bạn, vì điều này có thể gây ra tác dụng xấu với thuốc alimta.
- Nếu bạn bị bệnh tim hoặc có tiền sử bệnh tim, hãy nói với bác sĩ của bạn.
- Nếu bạn có sự tích tụ chất lỏng xung quanh phổi, bác sĩ có thể quyết định loại bỏ chất lỏng trước khi đưa cho bạn thuốc alimta
- Trẻ em và thanh thiếu niên không được dùng thuốc alimta





Thuốc alimta 100mg pemetrexed điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (2)

Liều dùng thuốc alimta 100mg bao nhiêu?

Liều dùng và lịch trình khuyến nghị cho NSCLC không vẩy

- Liều thuốc alimta được khuyến nghị kết hợp với cisplatin để điều trị ban đầu NSCLC ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinin là 45 ml/phút hoặc lớn hơn là 500 mg/m² dưới dạng tiêm truyền tĩnh mạch trong hơn 10 phút trước khi tiêm truyền cisplatin vào ngày 1 của mỗi chu kỳ 21 ngày trong tối đa sáu chu kỳ trong trường hợp không có tiến triển bệnh hoặc độc tính không được chấp nhận.
- Liều thuốc alimta được khuyến nghị để điều trị duy trì NSCLC ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinin là 45 ml/phút hoặc cao hơn là 500mg/m² dưới dạng tiêm truyền tĩnh mạch trong 10 phút vào ngày 1 của mỗi 21- chu kỳ ngày cho đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không thể chấp nhận sau bốn chu kỳ hóa trị liệu tuyến đầu dựa trên bạch kim.



Liều dùng khuyến nghị và lịch trình cho U trung biểu mô

- Liều khuyến cáo của thuốc alimta, dùng kết hợp với cisplatin, ở những bệnh nhân có độ thanh thải creatini là 45 ml/phút hoặc lớn hơn là 500mg/m² dưới dạng tiêm truyền tĩnh mạch trong 10 phút vào ngày 1 mỗi lần chu kỳ 21 ngày cho đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được.

Cách sử dụng thuốc alimta như thế nào cho đúng?

- Bác sĩ của bạn nên khuyên bạn dùng một số loại thuốc hoặc vitamin trong khi dùng thuốc alimta. Những điều này có thể giúp giảm thiểu tác dụng phụ.
- Bác sĩ của bạn nên khuyên bạn nên bổ sung folate hoặc vitamin tổng hợp có chứa folate mỗi ngày một lần trong ít nhất năm ngày trong tuần trước khi dùng liều thuốc alimta đầu tiên của bạn. Điều này nên được tiếp tục trong suốt chu kỳ trị liệu của bạn và trong ít nhất ba tuần sau khi hoàn thành điều trị thuốc alimta.
- Bác sĩ cũng nên khuyên bạn nên tiêm vitamin B12 trong tuần trước khi dùng liều thuốc alimta đầu tiên. Nên tiêm vitamin B12 cứ sau ba chu kỳ điều trị.
- Bác sĩ cũng có thể khuyên bạn nên dùng một loại thuốc corticosteroid đường uống như dexamethasone để giảm khả năng và mức độ nghiêm trọng của phát ban da.
- Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về lý do tại sao các loại thuốc khác đã được quy định cho bạn.



Thuốc pemetrexed tương tác với thuốc nào?

- Vui lòng cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào để giảm đau hoặc viêm (sung), chẳng hạn như các loại thuốc được gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID), bao gồm cả các loại thuốc mua không có toa của bác sĩ (như ibuprofen).
- Có nhiều loại NSAID khác nhau thời lượng hoạt động. Dựa trên ngày dự kiến truyền thuốc alimta của bạn hoặc dựa trên tình trạng của chức năng thận của bạn, bác sĩ cần tư vấn cho bạn về loại thuốc bạn có thể dùng và khi nào bạn có thể lấy chúng.
- Vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã sử dụng bất kỳ loại nào khác thuốc, bao gồm cả thuốc thu được mà không cần toa.

Tác dụng phụ thuốc alimta là gì?

Rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)

- Bạch cầu và tiểu cầu thấp
- Mức huyết sắc tố thấp (thiếu máu)
- Bệnh tiêu chảy, phát ban da, táo bón
- Đau, đỏ, sung hoặc lở loét trong miệng
- Buồn nôn, ăn mất ngon, mất cảm giác
- Mệt mỏi, rụng tóc, phát ban da, táo bón
- Thận: xét nghiệm máu bất thường

Thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)



- Phản ứng dị ứng: phát ban da nóng rát hoặc cảm giác châm chích
- Nhiễm trùng bao gồm nhiễm trùng huyết
- Sốt, mất nước, suy thận, tăng sắc tố da
- Kích ứng da và ngứa, đau ngực, yếu cơ
- Viêm kết mạc (viêm mắt), chảy nước mắt
- Đau dạ dày, đau bụng, thay đổi vị giác
- Gan: xét nghiệm máu bất thường

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 100 người)

- Suy thận cấp, nhịp tim nhanh
- Viêm niêm mạc thực quản (gONS) đã được trải nghiệm với thuốc alimta
- Viêm đại tràng (viêm niêm mạc ruột già, có thể đi kèm với ruột hoặc chảy máu trực tràng)
- Viêm phổi kẽ (sẹo túi khí của phổi)
- Phù (chất lỏng dư thừa trong mô cơ thể, gây sưng)

Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1.000 người)

- Thu hồi bức xạ (phát ban da như cháy nắng nghiêm trọng) có thể xảy ra trên da trước đây tiếp xúc với xạ trị, từ vài ngày đến nhiều năm sau khi xạ trị.
- Tình trạng nặng nề (bệnh da phỏng rộp) bao gồm hội chứng Stevens-Johnson và chất độ choại tử biểu bì.
- Thiếu máu tan máu qua trung gian miễn dịch (phá hủy qua trung gian kháng thể của các tế bào hồng cầu).
- Sốc phản vệ (phản ứng dị ứng nghiêm trọng), viêm gan





Thuốc alimta 100mg pemetrexed điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (3)

Ảnh hưởng alimta đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?

Navelbine đối với khả năng sinh sản

- Đàn ông được khuyên không nên làm cha một đứa trẻ trong và đến 6 tháng sau khi điều trị bằng thuốc alimta và do đó nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị bằng thuốc alimta và tối đa 6 tháng sau.
- Nếu bạn muốn làm cha trong khi điều trị hoặc trong 6 tháng sau khi nhận được điều trị, tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Bạn có thể muốn tìm kiếm tư vấn về lưu trữ tinh trùng trước khi bắt đầu trị liệu của bạn.

Navelbine đối với phụ nữ mang thai



- Nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy nói với bác sĩ của bạn. Cách sử dụng thuốc alimta nên tránh trong thai kỳ. Bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về tiềm năng nguy cơ dùng thuốc alimta khi mang thai.
- Phụ nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị với thuốc alimta.

Navelbine đối với phụ nữ cho con bú

- Nếu bạn đang cho con bú, hãy nói với bác sĩ của bạn. Phải ngừng cho con bú trong khi điều trị thuốc alimta.

Ảnh hưởng alimta đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?

- Thuốc alimta có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Cần thận khi lái xe hoặc sử dụng máy móc

Lưu trữ bảo quản thuốc alimta thế nào?



- Giữ thuốc alimta ra khỏi tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
- Không sử dụng thuốc alimta sau ngày hết hạn được ghi trên nhãn và thùng carton.
- Thuốc alimta không yêu cầu bất kỳ điều kiện lưu trữ đặc biệt.
- Giải pháp tái tạo và tiêm truyền: Sản phẩm nên được sử dụng ngay lập tức. Khi chuẩn bị như sự ổn định theo chỉ đạo, hóa học và sử dụng vật lý của các giải pháp hoàn nguyên và truyền dịch của pemetrexed đã được chứng minh trong 24 giờ ở nhiệt độ lạnh.
- Thuốc alimta chỉ dùng một lần; bất kỳ giải pháp không sử dụng phải được xử lý theo địa phương yêu cầu

Giá thuốc alimta bao nhiêu?

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc alimta ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc pemetrexed ở đâu?

- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc alimta 100mg pemetrexed uy tín trên thị trường.
- Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc alimta chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.



» Xem thêm thông tin thuốc alimta 100mg

<https://thuocdactri247.com/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-tri-ung-thu-phoi>

» Xem thêm thuốc navelbine điều trị ung thư phổi

<https://thuocdactri247.com/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-tri-ung-thu/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Alimta 100mg Pemetrexed** với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.


Nguồn Tham Khảo: <https://www.drugs.com/alimta.html>

(Ngày cập nhật:16-8-2019)


5.0 01 ★★★★★

Like this:

Có liên quan



Thuốc opdivo
100mg/10ml
nivolumab giá bao
nhiêu?
14/04/2018
In "Thuốc điều trị
ung thư tuyến tụy"



Thuốc keytruda
100mg/4ml
pembrolizumab trị
ung thư
20/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc remicade
100mg infliximab
giá bao nhiêu
25/07/2018
In "Thuốc loãng
xương"

