

Thuốc esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi

Bởi Nguyễn Lê Mộng Thoa - 16/08/2019



Thuốc esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi - Thuốc đặc trị 247

Thuốc esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc esbriet 267mg pirfenidone
2. Thuốc esbriet 267mg là gì? Thuốc pirfenidone dùng để làm gì?
3. Chỉ định điều trị thuốc esbriet cho ai?
4. Chống chỉ định điều trị thuốc esbriet với ai?
5. Đừng uống thuốc esbriet trong các trường hợp nào?
6. Một số cảnh báo và đề phòng nào cần lưu ý?
7. Liều dùng thuốc esbriet 267mg bao nhiêu?
8. Nên làm gì nếu dùng quá liều thuốc esbriet?
9. Nên làm gì nếu quên một liều thuốc esbriet?
10. Nên làm gì khi ngừng dùng thuốc esbriet?
11. Sử dụng thuốc esbriet thế nào hiệu quả?
12. Thuốc pirfenidone tương tác với thuốc nào?
 - 12.1. Các loại thuốc có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc esbriet
 - 12.2. Các loại thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc esbriet
 - 12.3. Thuốc esbriet với thức ăn và đồ uống
13. Thuốc pirfenidone có những tác dụng phụ nào?
 - 13.1. Tác dụng phụ pirfenidone rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)
 - 13.2. Tác dụng phụ pirfenidone thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)
 - 13.3. Tác dụng phụ pirfenidone hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1.000 người)
14. Pirfenidone ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?
15. Pirfenidone ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
16. Lưu trữ bảo quản thuốc esbriet 267mg như thế nào?
17. Giá thuốc esbriet bao nhiêu?
18. Mua thuốc pirfenidone ở đâu?
 - 18.1. Like this:
 - 18.2. Có liên quan


Thông tin cơ bản thuốc esbriet 267mg pirfenidone



- Tên thương hiệu: **Esbriet**
- Thành phần hoạt chất: **Pirfenidone**
- Hãng sản xuất: Roche
- Hàm lượng: 267mg
- Dạng : Dạng viên nang
- Đóng gói: 267mg 1 hộp

Thuốc esbriet 267mg là gì? Thuốc pirfenidone dùng để làm gì?

- Thuốc esbriet chứa hoạt chất pirfenidone và nó được sử dụng để điều trị từ nhẹ đến trung bình xơ phổi vô căn (IPF) ở người lớn.
- IPF là tình trạng các mô trong phổi của bạn bị sưng và sẹo theo thời gian, và như một kết quả làm cho khó thở sâu. Điều này làm cho phổi của bạn khó hoạt động bình thường. Thuốc esbriet giúp giảm sẹo và sưng trong phổi và giúp bạn thở tốt hơn



Chỉ định điều trị thuốc esbriet cho ai?

- Thuốc esbriet được chỉ định ở người lớn để điều trị xơ phổi vô căn nhẹ đến trung bình (IPF).

Chống chỉ định điều trị thuốc esbriet với ai?

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc
- Lịch sử phù mạch với pirfenidone
- Sử dụng đồng thời fluvoxamine
- Suy gan nặng hoặc bệnh gan giai đoạn cuối
- Suy thận nặng ($\text{CrCl} < 30 \text{ ml / phút}$) hoặc bệnh thận giai đoạn cuối cần lọc máu

Đừng uống thuốc esbriet trong các trường hợp nào?



- Nếu bạn bị dị ứng với thuốc pirfenidone hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc
- Nếu trước đây bạn đã từng bị phù mạch với thuốc pirfenidone, bao gồm các triệu chứng như sưng mắt, môi hoặc lưỡi có thể liên quan đến khó thở hoặc khó khè
- Nếu bạn đang dùng một loại thuốc gọi là fluvoxamine (được sử dụng để điều trị trầm cảm và ám ảnh rối loạn bắt buộc [OCD])
- Nếu bạn bị bệnh gan nặng hoặc giai đoạn cuối
- Nếu bạn bị bệnh thận nặng hoặc giai đoạn cuối cần lọc máu. Nếu bất kỳ điều nào ở trên ảnh hưởng đến bạn, đừng dùng thuốc esbriet. Nếu bạn không chắc chắn hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Một số cảnh báo và đề phòng nào cần lưu ý?



- Bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời (phản ứng nhạy cảm ánh sáng) khi dùng esbriet. Tránh ánh nắng mặt trời (bao gồm cả ánh sáng mặt trời) trong khi dùng thuốc esbriet.
- Mặc áo chống nắng hàng ngày và che cánh tay, chân và đầu để giảm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
- Bạn không nên dùng các loại thuốc khác, chẳng hạn như kháng sinh tetracycline (như doxycycline), có thể làm cho bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời.
- Bạn nên nói với bác sĩ nếu bạn bị các vấn đề về thận
- Bạn nên nói với bác sĩ nếu bạn bị các vấn đề về gan nhẹ đến trung bình.
- Bạn nên ngừng hút thuốc trước và trong khi điều trị bằng esbriet. Thuốc lá có thể làm giảm tác dụng của thuốc esbriet.
- Thuốc esbriet có thể gây chóng mặt và mệt mỏi. Hãy cẩn thận nếu bạn phải tham gia vào các hoạt động bạn phải cảnh giác và phối hợp.
- Thuốc esbriet có thể gây giảm cân. Bác sĩ sẽ theo dõi cân nặng của bạn trong khi bạn đang dùng thuốc này.
- Bạn sẽ cần xét nghiệm máu trước khi bắt đầu dùng thuốc esbriet và theo chu kỳ hàng tháng cho lần đầu tiên 6 tháng và sau đó cứ sau 3 tháng, trong khi bạn đang dùng thuốc này để kiểm tra xem gan của bạn đang hoạt động đúng.
- Điều quan trọng là bạn phải thực hiện các xét nghiệm máu thường xuyên này miễn là bạn đang dùng esbriet.

Liều dùng thuốc **esbriet 267mg** bao nhiêu?



Thuốc esbriet 267mg thường được dùng với liều lượng tăng dần như sau:

- Trong 7 ngày đầu dùng một liều 267mg (1 viên màu vàng), 3 lần một ngày với thức ăn (tổng cộng 801 mg / ngày)
- Từ ngày 8 đến 14 uống một liều 534mg (2 viên màu vàng hoặc 1 viên cam), 3 lần một ngày với thức ăn (tổng cộng 1.602 mg / ngày)
- Từ ngày 15 trở đi (duy trì), dùng liều 801mg (3 viên màu vàng hoặc 1 viên màu nâu), 3 lần một ngày với thức ăn (tổng cộng 2.403 mg / ngày).
- Liều duy trì hàng ngày của thuốc esbriet là 801mg (3 viên màu vàng hoặc 1 viên màu nâu) ba lần một ngày với thức ăn, tổng cộng 2403mg / ngày



Thuốc esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi – Thuốc đặc trị 247 (2)

Nên làm gì nếu dùng quá liều thuốc esbriet?

- Liên lạc với bác sĩ, dược sĩ ngay lập tức nếu bạn đã thực hiện nhiều viên hơn bạn nên và mang theo thuốc.



Nên làm gì nếu quên một liều thuốc esbriet?

- Nếu bạn quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra.
- Không dùng một liều gấp đôi để bù cho liều đã quên. Mỗi liều nên cách nhau ít nhất 3 giờ. Không uống nhiều viên mỗi ngày hơn liều quy định hàng ngày của bạn.

Nên làm gì khi ngừng dùng thuốc esbriet?

- Trong một số tình huống, bác sĩ có thể khuyên bạn ngừng dùng esbriet. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn phải ngừng dùng thuốc esbriet trong hơn 14 ngày liên tục, bác sĩ sẽ bắt đầu lại quá trình điều trị của bạn với liều 267mg 3 lần một ngày, tăng dần đến liều 801mg 3 lần một ngày.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Sử dụng thuốc esbriet thế nào hiệu quả?

- Điều trị bằng thuốc esbriet nên được bắt đầu và giám sát bởi một bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị IPF.
- Luôn luôn dùng esbriet chính xác như bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ của bạn hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn.
- Nuốt cả viên với một ly nước, trong hoặc sau bữa ăn để giảm nguy cơ tác dụng phụ như buồn nôn (cảm thấy ốm) và chóng mặt. Nếu triệu chứng tiếp tục, đi khám bác sĩ.



Thuốc pirfenidone tương tác với thuốc nào?

- Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng, gần đây đã uống hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác
- Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau, vì chúng có thể thay đổi tác dụng của thuốc esbriet.

Các loại thuốc có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc esbriet

- Enoxacin (một loại kháng sinh)
- Ciprofloxacin (một loại kháng sinh)
- Amiodarone (dùng để điều trị một số loại bệnh tim)
- Propafenone (được sử dụng để điều trị một số loại bệnh tim)
- Fluvoxamine (được sử dụng để điều trị trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (ocd)).

Các loại thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc esbriet

- Omeprazole (được sử dụng trong điều trị các tình trạng như khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản bệnh)
- Rifampicin (một loại kháng sinh).

Thuốc esbriet với thức ăn và đồ uống

- Không uống nước bưởi trong khi dùng thuốc esbriet. Bưởi có thể ngăn chặn esbriet từ làm việc đúng cách

Thuốc pirfenidone có những tác dụng phụ nào?

Ngừng dùng thuốc esbriet và nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức



- Nếu bạn bị sưng mắt, môi hoặc lưỡi, khó thở hoặc thở khò khè, đó là dấu hiệu của phù mạch, một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Đây là một tác dụng phụ không phổ biến.
- Nếu bạn bị vàng mắt hoặc da, hoặc nước tiểu sẫm màu, có khả năng đi kèm với ngứa da, là dấu hiệu của xét nghiệm chức năng gan bất thường. Đây là những tác dụng phụ hiếm gặp.

Tác dụng phụ pirfenidone rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1 trên 10 người)

- Phản ứng da sau khi ra ngoài nắng hoặc sử dụng ánh nắng mặt trời
- Cảm thấy ốm: buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu, ăn mất ngon
- Bệnh tiêu chảy
- Khó tiêu hoặc đau dạ dày

Tác dụng phụ pirfenidone thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)



- Nhiễm trùng cổ họng hoặc đường dẫn khí đi vào phổi hoặc viêm xoang
- Nhiễm trùng bàng quang, giảm cân, bị chóng mặt
- Khó ngủ, khó thở, ho, thay đổi khẩu vị
- Nóng bừng, đau ngực, đau cơ, đau khớp
- Các vấn đề về da dày như trào ngược axit, nôn mửa, cảm thấy chướng bụng, đau bụng và khó chịu, đau tim, cảm thấy táo bón và gió thổi
- Xét nghiệm máu có thể cho thấy mức độ tăng của men gan
- Các vấn đề về da như da ngứa, đỏ da hoặc đỏ da, khô da, nổi mẩn da
- Cảm thấy yếu hoặc cảm thấy năng lượng thấp

Tác dụng phụ pirfenidone hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1.000 người)

- Xét nghiệm máu có thể cho thấy giảm các tế bào bạch cầu.

Pirfenidone ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?

- Để phòng ngừa, tốt nhất nên tránh sử dụng thuốc esbriet nếu bạn đang mang thai, dự định mang thai, hoặc nghĩ rằng bạn có thể mang thai vì những rủi ro tiềm ẩn đối với thai nhi là không xác định.
- Nếu bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc esbriet.
- Vì không biết liệu thuốc esbriet có truyền vào sữa mẹ hay không, bác sĩ sẽ thảo luận về những rủi ro và lợi ích của việc dùng esbriet trong khi cho con bú nếu bạn quyết định làm như vậy.





Thuốc esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi – Thuốc đặc trị 247 (3)

Pirfenidone ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?

- Không lái xe hoặc sử dụng máy móc nếu bạn cảm thấy chóng mặt hoặc mệt mỏi sau khi dùng thuốc esbriet.

Lưu trữ bảo quản thuốc esbriet 267mg như thế nào?



- Giữ thuốc esbriet ra khỏi tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
- Không sử dụng esbriet sau ngày hết hạn được ghi trên nhãn chai, vỉ và thùng cartonsau EXP. Ngày hết hạn đề cập đến ngày cuối cùng của tháng đó.
- Thuốc esbriet không yêu cầu bất kỳ điều kiện lưu trữ đặc biệt.
- Đừng vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào thông qua nước thải hoặc chất thải gia đình. Hỏi dược sĩ của bạn làm thế nào để vứt bỏ thuốc bạn không còn sử dụng. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Giá thuốc esbriet bao nhiêu?

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc esbriet ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc pirfenidone ở đâu?

- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc esbriet 267mg pirfenidone uy tín trên thị trường. Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc esbriet chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

» **Xem thêm thông tin thuốc esbriet 267mg**



<https://thuocdactri247.com/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi>

» Xem thêm thuốc alimta điều trị ung thư phổi

<https://thuocdactri247.com/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-tri-ung-thu-phoi/>


Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Esbriet 267mg Pirfenidone** với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Tham Khảo: <https://www.drugs.com/esbriet.html> (Ngày cập nhật:16-8-2019)


5.0 02 ★★★★★

Like this:

Có liên quan



Thuốc tecentriq
1200mg/20ml
atezolizumab điều
trị ung thư
14/08/2019
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc iressa 250mg
gefitinib
19/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc rilutek 50mg
riluzole có tác dụng
gì?
25/12/2017
In "Thuốc teo cơ"

