

KIẾN THỨC THUỐC

Thuốc Rodogyl chứa metronidazol và spiramycin điều trị nhiễm trùng răng

POSTED ON THÁNG NĂM 1, 2020 BY LUCY TRINH

01
Th5NhaThuocLP.com

Mục Lục



1. Rodogyl là thuốc gì?
 1. Thông tin về thuốc Rodogyl 125mg
2. Tác dụng, chỉ định của thuốc Rodogyl
3. Cơ chế hoạt động của thuốc Rodogyl (Spiramycin và Metronidazole)
4. Chống chỉ định của thuốc
5. Liều dùng thuốc Rodogyl
6. Hướng dẫn sử dụng thuốc Rodogyl 125
7. Những lưu ý khi sử dụng thuốc

[Contact us](#)



11. Bảo quản thuốc
12. Nguồn tham khảo thuốc Rodogyl

Mới cập nhật 24 Tháng Sáu, 2020

Thuốc Rodogyl chứa metronidazol và spiramycin điều trị nhiễm trùng răng.

Thuốc Rodogyl là thuốc gì? Công dụng, tác dụng, những thông tin cơ bản về dòng thuốc này ra sao, giá bán và những tác dụng phụ có thể gặp phải? Tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

Rodogyl một trong những sản phẩm thuốc được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng răng hiệu quả và an toàn. Bài viết dưới đây, các dược sĩ tại NhaThuocLP.com sẽ mang đến những thông tin về thuốc một cách chi tiết và chính xác nhất. Bạn sẽ biết rõ Rodogyl là thuốc gì? Công dụng, giá bán, tác dụng cũng như các cảnh báo cũng như tương tác của thuốc.

Rodogyl là thuốc gì?

Trước khi tìm hiểu kỹ hơn về dòng thuốc này, hẳn đây là câu hỏi đầu tiên mà bất cứ ai cũng quan tâm. **Rodogyl là thuốc gì**, đây chính là thuốc kháng sinh, chúng thuộc nhóm nitroimidazole.

Rodogyl được sử dụng điều trị các chứng bệnh do nhiễm trùng gây ra trong đó đặc biệt là các bệnh liên quan đến răng. Trong nhiều phác đồ điều trị, thuốc được sử dụng như một thành phần lên đơn chính, mang đến hiệu quả cao cũng như sự an toàn tối ưu cho người bệnh.

Thông tin về thuốc Rodogyl 125mg

- Tên thương hiệu: **Rodogyl**
- Thành phần hoạt chất: **Spiramycin & Metronidazole**
- Hàm lượng: 750.000IU & 125mg (Spiramycin 750.000IU & Metronidazole 125mg)

Contact us

- Giá Thuốc Rodogyl : BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá.
- Trên thị trường việt nam có thuốc Rodogy Pháp, Thuốc Rodogy Italia,
- Các nước có kinh doanh thuốc Rodogyl thành phần Metronidazole và Spiramycin gồm Bulgaria, Ai Cập, Pháp, Cô-oét, Lebanon, Malaysia, Malta, Mexico, unisia, Uruguay.



Thuoc Rodogyl chua metronidazol va spiramycin dieu tri nhiem trung rang tphcm hanoi (2)

Tác dụng, chỉ định của thuốc Rodogyl

Thuốc Rodogyl được dùng với vai trò là thuốc kháng sinh trị viêm, nhiễm trùng. Trong thuốc có chứa 2 loại hợp chất gồm Spiramycin và Metronidazole. Chúng được chỉ định trong việc điều trị các chứng bệnh như sau:

- Điều trị nhiễm trùng sau phẫu thuật trong nha khoa do biến chứng ca mô gây ra.
- Điều trị chứng áp xe răng, nha chu, sưng nướu răng

Contact us



Nhìn chung, Rodogyl được sử dụng như một trong những loại thuốc chính điều trị các chứng viêm, nhiễm trùng, bung mủ của răng. Chúng được rất nhiều bác sĩ nha khoa sử dụng và ghi nhận kết quả trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Cơ chế hoạt động của thuốc Rodogyl (Spiramycin và Metronidazole)

Rodogyl với việc chứa 2 hoạt chất chính gồm Spiramycin và Metronidazole mang đến khả năng chống sưng tấy, nhiễm trùng. Chúng có cơ chế hoạt động đơn giản bằng việc xâm nhập vào các tế bào vi khuẩn tại vùng bị nhiễm khuẩn hoặc có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Sau khi xâm nhập, hoạt chất tìm cách tác động lên một vài thành phần của tế bào nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn đồng thời ức chế hoạt động sống của chúng. Từ đó, hạn chế và làm mất dần chứng nhiễm trùng đang diễn ra hoặc phòng chống khả năng nhiễm trùng tại chỗ do được can thiệp bởi y khoa.

Chống chỉ định của thuốc

Thuốc đau răng Rodogyl được chống chỉ định trong các trường hợp:

- Các bệnh nhân quá mẫn cảm với thành phần của thuốc
- Bệnh nhân được xác định dị ứng với hoạt chất kháng sinh trong thuốc hoặc có tiền sử dị ứng kháng sinh.
- Bệnh nhân đang mang thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ. Trường hợp này cần hỏi ý kiến của bác sĩ, vì chúng có thể gây những bất lợi của sự phát triển thai nhi. Bạn tốt nhất khi xác định dùng thuốc nên cai sữa hoặc dùng các biện pháp tránh thai an toàn, hạn chế tối đa tình trạng mang thai khi sử dụng Rodogyl.

Liều dùng thuốc Rodogyl

Contact us



phép của bác sĩ.

Liều dùng của thuốc Rodogyl được các bác sĩ chuyên khoa kê đơn cụ thể

Liều dùng được khuyến cáo của thuốc thông thường gồm:

- Người trưởng thành (từ 16 tuổi trở lên): uống 4 – 6 viên trong ngày, chia làm 2 – 3 lần uống.
- Trẻ trong độ tuổi 10 – 15 tuổi uống 3 lần/1 ngày, 1 viên/ 1 lần uống.
- Trẻ ở tuổi 6 – 10 tuổi sử dụng: 2 viên/ 1 ngày, chia làm 2 lần uống.
- Trẻ dưới 6 tuổi chưa có khuyến cáo liều dùng, bạn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Hướng dẫn sử dụng thuốc Rodogyl 125

Trước khi sử dụng thuốc, ngoài những hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ, dược sĩ, người bệnh cần đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng có trong mỗi hộp thuốc. Tại đây có ghi cụ thể thành phần, công dụng, tác dụng phụ cũng như khuyến cáo khi dùng thuốc. Từ đó, có thể giúp người bệnh có những kiến thức cơ bản cùng xử lý kịp thời khi có bất kỳ biến chứng nào xảy ra.

Thuốc nên uống sau ăn khoảng 30 phút, hoặc ít nhất bạn phải lót dạ bằng một ly sữa. Điều này giúp hạn chế những tác động tiêu cực mà nhóm thuốc kháng sinh gây ra cho dạ dày người dùng.

Thuốc Rodogyl được khuyến cáo nên sử dụng cùng một thời điểm mỗi ngày để tăng hiệu quả điều trị. Vì thế, để tránh quên liều hãy tiến hành đặt lịch hẹn mỗi ngày.

Thuốc dùng không nên nghiền nát, nhai dập khi uống, hãy uống với một cốc nước to.

Contact us



tình trạng quên liều, uống quá liều. Một vài lưu ý dành cho việc người bệnh quên sử dụng thuốc hoặc lỡ uống nhiều hơn hàm lượng quy định như sau:

Lưu ý dùng nước lọc để uống thuốc

Nước uống thuốc không nên dùng nước trà, nước hoa quả, nước có gas. Nước tốt nhất là nước lọc, nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị của thuốc.

Khi quên liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, lưu ý 2 liều phải cách nhau ít nhất 3 tiếng.

Tuyệt đối không gộp 2 liều vào uống cùng một lúc. Chúng có thể không vượt quá hàm lượng cần thiết quy định cho 1 ngày nhưng vẫn được coi là dùng thuốc quá liều. Nếu sau khi uống thuốc, bạn cảm thấy cơ thể ngứa ran, chóng mặt, buồn nôn, tay chân có hiện tượng co cứng, tê liệt hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa kịp thời.

Tác dụng phụ của thuốc

Thuốc Rodogyl trong quá trình sử dụng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Tỷ lệ người mắc các triệu chứng này rất hiếm, tuy nhiên nếu bạn là một trong những trường hợp đó cần theo dõi cẩn thận tránh những rủi ro về sức khỏe.

Tác dụng phụ thường gặp

Rodogyl có thể gây ra các tác dụng phụ thường gặp nhưng không quá nguy hiểm như:

Ảnh hưởng tới đường ruột, đường tiêu hóa

Dùng thuốc ở 1 – 2 liều đầu tiên hoặc sau khoảng thời gian quá dài, người có thể gặp triệu chứng đau dạ dày, tiêu chảy thể nhẹ, ăn không ngon miệng. [Contact us](#)



Ảnh hưởng tới sức khỏe

Rodogyl cũng có thể khiến bạn có cảm giác chóng mặt như thiếu máu, tụt huyết áp. Ngoài ra, chúng cũng được nghiên cứu có thể gây khô miệng, nhiệt sung miệng, ho hoặc hắt hơi sổ mũi như người bị cảm. Nếu không quan sát cụ thể rất nhiều người nhầm lẫn giữa tác dụng phụ này với triệu chứng của bệnh cảm, viêm họng.

Ảnh hưởng tới màu nước tiểu

Nước tiểu đi có màu hơi sẫm, mùi khai hơn. Điều này là do chúng bị tác động tới gan, làm chức năng gan một phần bị suy giảm.

Các tác dụng phụ hiếm gặp

Bên cạnh những tác dụng phụ kể trên, dùng **Rodogyl thuốc** cũng có thể gây ra các hiện tượng có phần nguy hiểm cao hơn như:

- Cơ thể tê, ngứa và có thể nổi mẩn đỏ. Ban đầu người bệnh sẽ có cảm giác như bị dị ứng, sau dần các cơn ngứa và vết tê mẩn nổi lên nhiều hơn nhất là ở phần tay và chân ngay sau khi uống thuốc.
- Miệng, môi xuất hiện nhiều vết loét, mảng trắng to và dày đặc giống với bị nhiệt miệng.
- Tâm lý căng thẳng, dễ lo lắng và stress. Cơ thể có hiện tượng sốt nhẹ, ớn lạnh, mệt mỏi khó tập trung khi làm việc.
- Có hiện tượng bị động kinh, cơ co quắp, cổ cứng, thường xuyên nói lắp. Đặc biệt, đi tiểu cảm thấy buốt rát, khó chịu.
- Trí nhớ có thể bị tác động tiêu cực, dễ bị nhầm lẫn. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải hiện tượng đau xương khớp, chân tay run rẩy....

Contact us



Ngoài ra, nếu cơ thể quá mệt mỏi, bạn cần lập tức đến thăm khám tại các cơ sở y tế để có được chẩn đoán chính xác.

Quá trình dùng Rodogyl trị đau răng có thể xảy ra ít nhiều tác dụng phụ khác nhau

Cảnh báo của thuốc khi dùng

Thuốc Rodogyl được cảnh báo không được dùng rượu, bia hay các chất có cồn khác trong quá trình dùng thuốc và sau khi kết thúc điều trị ít nhất 3 ngày. Bởi lẽ, chúng có thể gây ra không ít tác động tiêu cực tới dạ dày như co thắt dạ dày, nôn, tiêu chảy....

Nếu bạn từng mắc các căn bệnh về thần kinh dai dẳng đặc biệt thần kinh ngoại biên, hãy cẩn trọng khi dùng thuốc. Bạn cần lập tức báo lại tình trạng sức khỏe khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào sau uống thuốc Rodogyl.

Xác định rõ bệnh, không tự ý dùng thuốc chỉ dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, bạn nên nói rõ tiền sử dị ứng của bản thân hoặc những người thân trong gia đình về một vài hoạt chất trong y học. Điều đó giúp phỏng đoán sự phù hợp của cơ thể trong việc điều trị, tránh tác dụng phụ do dị ứng thành phần thuốc gây lên.

Thuốc có thể để lại những tác động không mong muốn tới gan, lượng bạch cầu trong máu. Vì thế, rất có thể trong quá trình điều trị người bệnh sẽ thường xuyên được chỉ định làm xét nghiệm tình trạng của những chức năng đó.

Tương tác của thuốc

Rodogyl có thể xảy ra những tương tác với một vài nhóm thực phẩm hoặc nhóm thuốc. Vì vậy, bạn nhất định phải trao đổi với bác sĩ trước khi kê đơn về loại thuốc mà bạn đang dùng từ thuốc điều trị, thực phẩm chức năng đến vitamin.

Tương tác của thuốc với các thành phần thuốc khác

Contact us



- Thuốc uống chống đông Disulfiram, Heparin
- Thuốc tránh thai như Terfenadin, fluphenazin, phenytoin.
- Các loại thuốc khác như: Carbidopa, Cyclosporine, cimetidine....

Tương tác với thực phẩm

Rodogyl đôi khi xảy ra tương tác đối với các nhóm đồ uống đặc biệt đồ uống mang tính kích thích, có cồn hay các thực phẩm khác nhau. Vì thế, hãy lắng nghe sự lưu ý của bác sĩ để tránh việc khiến cơ thể tiếp nhận những loại thực phẩm có hại đến sức khỏe cũng như khả năng hấp thụ của thuốc.

Bảo quản thuốc


Thuốc Rodogyl được bảo quản ở nhiệt độ phòng lý tưởng từ 20 đến 27 độ C. Lưu ý, không nên để trong nhiệt độ dưới 15 độ và trên 32 độ C. Chúng có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng thuốc.

Chỉ bóc trần thuốc ra khỏi vỉ khi có ý định sử dụng

Thuốc cần để xa tầm với trẻ em và động vật.

Thuốc không được để nơi ẩm ướt, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Tuyệt đối không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng, thuốc đổi màu do không khí xâm nhập. Vì thế, bạn chỉ bóc thuốc khi sử dụng, kiểm tra hạn dùng trước khi uống.



Thuốc Rodogyl chứa metronidazol và spiramycin điều trị nhiễm trùng răng tphcm hanoi (3)

Nguồn tham khảo thuốc Rodogyl

- Nguồn gmedication.com bài viết Rodody: <https://www.gmedication.com/?s=rodogyl> cập nhật 18/10/2019
- Nguồn drugs.com bài viết rodogyl: <https://www.drugs.com/international/rodogyl.html> cập nhật 18/10/2019.

Rodogyl thuốc điều trị đau răng an toàn và hiệu quả. Sản phẩm được khá nhiều nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa kê đơn và đánh giá cao về chất lượng điều trị. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn cần tuyệt đối để ý để có được hiệu quả tối ưu. Trên đây chỉ là những thông tin tham khảo, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết như giá thuốc Rodogyl, cách dùng cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Bác sĩ [Lucy Trinh](#)

Rate this post

[Lucy Trinh Edit profile](#)

[Contact us](#)



thư và điều trị ung thư theo từng giai đoạn.

NhaThuocLP.com được nhiều bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và hàng ngàn bệnh nhân tin tưởng.

Trang web của nhà thuốc LP: <https://nhathuoclp.com/>



Settings

Chia sẻ:



This entry was posted in [Kiến thức thuốc](#) and tagged [địa chỉ bán thuốc Rodogyl](#), [giá thuốc Rodogyl](#), [giá thuốc rodogyl 125mg](#), [giá thuốc rodogyl của italy](#), [giá thuốc Rodogyl pháp](#), [Metronidazole](#), [mua thuốc Rodogyl ở đâu](#), [phân biệt thuốc Rodogyl thật giả](#), [Rodogyl](#), [Rodogyl 125mg](#), [Rodogyl 750](#), [rodogyl của pháp giá bao nhiêu](#), [Rodogyl giá bao nhiêu](#), [Spiramycin](#), [thuoc Rodogyl](#), [thuốc Rodogyl giả thật](#), [thuốc rodogyl màu trắng](#), [thuốc rodogyl thật và giả](#), [thuốc thay thế rodogyl](#).

Trả lời

Đã đăng nhập bằng tài khoản Lucy Trinh. Đăng xuất?

Bình luận

PHẢN HỒI

THUỐC UNG THƯ PHỔI TỐT NHẤT

Contact us



THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN TỐT NHẤT

Thuốc Nexavar 200mg Sorafenib điều trị ung thư gan, thận, tuyến giáp
Thuốc Sorafenat 200mg Sorafenib điều trị ung thư gan, thận, tuyến giáp
Thuốc Stivarga 40mg Regorafenib điều trị ung thư đại trực tràng

THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT TỐT

Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)
Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt
Thuốc Casodex 50mg Bicalutamide điều trị ung thư tuyến tiền liệt

THUỐC THÔNG DỤNG TỐT NHẤT

Thuốc Aclasta 5mg/100ml Zoledronic acid điều trị loãng xương
Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị mất cân bằng Hormone
Thuốc Ketosteril 600mg Methionine điều trị bệnh thận mãn tính

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Thuốc Nexium 40mg Esomeprazole điều trị trào ngược dạ dày
Thuốc Augmentin 250mg 625mg 1000mg kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn

Glucosamine hỗ trợ giảm đau viêm xương khớp
Enterogermina men vi sinh hỗ trợ đường tiêu hóa
Thuốc Ibuprofen điều trị giảm đau
Thuốc Piracetam giúp tăng cường nhận thức

GIỚI THIỆU NHÀ THUỐC LP

[Contact us](#)



chẩn đoán hoặc điều trị.

Hãy hỏi bác sĩ để có thông tin lời khuyên chính xác

Nhà Thuốc LP chia sẻ kiến thức không kinh doanh, mua bán online

FANPAGE NHÀ THUỐC LP



Nhà Thuốc LP - Thông Tin ...

132 likes

Like Page

Learn M

DMCA PROTECTED

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 2 Đường Số 20, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 70000

SĐT: 0776511918

Email: Nhathuoclp@gmail.com

Nhà Thuốc LP chia sẻ kiến thức không kinh doanh, mua bán online

[TRANG CHỦ](#) [DANH MỤC SẢN PHẨM](#) [BẢN TIN SỨC KHỎE](#)

Nhà Thuốc LP

[Contact us](#)