

Thuốc femara 2,5mg letrozole điều trị ung thư vú

Bởi Thuốc đặc trị 247 - 21/04/2018



Thuốc Femara 2,5mg Letrozole điều trị ung thư vú - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Femara (letrozole) làm giảm nồng độ estrogen ở phụ nữ mãn kinh, có thể làm chậm sự phát triển của một số loại khối u vú cần estrogen để phát triển trong cơ thể. Thuốc Femara được sử dụng để điều trị ung thư vú ở phụ nữ mãn kinh. Thuốc thường được trao cho những phụ nữ đã dùng tamoxifen (Nolvadex, Soltamox) trong 5 năm.

Thuốc **Femara 2,5mg Letrozole** điều trị ung thư vú hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247** ☎ **0901 771 516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Liên Hệ

Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc Femara 2,5mg letrozole
2. Thuốc Femara 2,5mg letrozole được sử dụng như thế nào?
3. Thuốc Femara hoạt động như thế nào?
4. Nên dùng thuốc Femara 2,5mg letrozole như thế nào?
5. Liều lượng của thuốc Femara được dùng như thế nào?
 - 5.1. Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư vú:
 - 5.2. Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư vú, chất bổ trợ:
6. Điều gì xảy ra nếu bỏ lỡ một liều?
7. Điều gì xảy ra nếu quá liều?
8. Những lưu ý trước khi dùng thuốc Femara 2,5mg Letrozole
 - 8.1. Bạn không nên sử dụng thuốc Femara nếu bạn bị dị ứng với letrozole hoặc nếu bạn có:
 - 8.2. Để đảm bảo thuốc này an toàn cho bạn, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có:
9. Liều dùng của thuốc Femara 2,5mg letrozole
10. Chỉ định điều trị thuốc Femara 2,5mg letrozole
11. Chống chỉ định điều trị thuốc Femara 2,5mg letrozole
12. Những lưu ý đặc biệt và biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thuốc Femara
 - 12.1. Đối với tình trạng mãn kinh
 - 12.2. Đối với suy thận
 - 12.3. Đối với suy gan
 - 12.4. Hiệu ứng xương
13. Thận trọng trước khi sử dụng thuốc Femara
14. Mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Femara
15. Tác dụng phụ của thuốc Femara
 - 15.1. Tác dụng phụ phổ biến (xảy ra trên 30%):
 - 15.2. Tác dụng phụ ít phổ biến hơn (xảy ra ở khoảng 10-29%):
16. Ảnh hưởng của thuốc Femara đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
 - 16.1. Phụ nữ có tình trạng tiền mãn kinh hoặc khả năng sinh con
 - 16.2. Phụ nữ mang thai
 - 16.3. Phụ nữ cho con bú
 - 16.4. Phụ nữ có khả năng sinh sản
17. Ảnh hưởng của thuốc Femara đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
18. Thuốc Femara 2,5mg letrozole mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 18.1. Like this:
 - 18.2. Có liên quan

Liên Hệ

Thông tin cơ bản **thuốc Femara 2,5mg letrozole**

- Tên thương hiệu: **Femara 2.5mg**
- Thành phần hoạt chất: **Letrozole**
- Hãng sản xuất: Novartis
- Hàm lượng: 2.5mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 30 viên nén

Giá thuốc femara: Bình Luận bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**



Thuốc Femara 2,5mg Letrozole điều trị ung thư vú – Thuoc đặc trị 247 (1)

Thuốc Femara 2,5mg letrozole được sử dụng như thế nào?

Liên Hệ

- Thuốc Femara là một viên thuốc, dùng bằng đường uống.
- Bạn nên dùng thuốc Letrozole vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Bạn có thể dùng thuốc Femara có hoặc không có thức ăn. Nếu bạn bỏ lỡ một liều, đừng dùng liều gấp đôi vào ngày hôm sau.
- Bạn không nên ngừng dùng thuốc Femara mà không thảo luận với bác sĩ của bạn.
- Lượng thuốc Femara mà bạn sẽ nhận được phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sức khỏe chung hoặc các vấn đề sức khỏe khác, và loại ung thư hoặc tình trạng đang được điều trị. Bác sĩ sẽ xác định liều của bạn và bạn sẽ dùng thuốc Femara trong bao lâu.

Thuốc Femara hoạt động như thế nào?

- Letrozole hoạt động bằng cách giảm lượng estrogen được tạo ra trong cơ thể.
- Một số bệnh ung thư vú được kích thích tăng trưởng bởi hormone estrogen. Chúng được gọi là ung thư vú thụ thể estrogen dương tính hoặc ER +.
- Letrozole thuộc về một nhóm thuốc gọi là chất ức chế aromatase .

Nên dùng thuốc Femara 2,5mg letrozole như thế nào?

- Thuốc Femara thường được thực hiện một lần mỗi ngày, hoặc một lần mỗi ngày. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn. Không dùng thuốc với số lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc lâu hơn so với khuyến cáo.
- Bạn có thể dùng thuốc có hoặc không có thức ăn.
- Trong khi sử dụng thuốc Femara, bạn có thể cần xét nghiệm y tế thường xuyên và mật độ khoáng xương cũng có thể cần được kiểm tra.
- Lưu trữ ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt.

Liều lượng của thuốc Femara được dùng như thế nào?

Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư vú:

- Để sử dụng như điều trị đầu tay của phụ nữ mãn kinh với thụ thể hoóc môn dương tính hoặc thụ thể hoóc môn chưa biết ung thư vú di căn hoặc tiến triển tại địa phương. Thuốc Femara cũng được chỉ định để điều trị ung thư vú tiến triển ở phụ nữ mãn kinh có tiến triển bệnh sau khi điều trị bằng thuốc kháng estrogen: viên 2,5 mg uống mỗi ngày một lần mà không liên quan đến bữa ăn.
- Ở những bệnh nhân mắc bệnh tiến triển, liệu pháp Letrozole nên tiếp tục cho đến khi tiến triển khối u rõ rệt.

Liều người lớn thông thường cho bệnh ung thư vú, chất bổ trợ:

- Để sử dụng như điều trị hỗ trợ kéo dài ung thư vú sớm ở phụ nữ mãn kinh đã điều trị tamoxifen 5 năm: viên nén 2,5 mg uống mỗi ngày một lần mà không liên quan đến bữa ăn.
- Thời gian điều trị tối ưu với Femara không được biết đến. Nên ngừng điều trị nếu có tái phát khối u.

Điều gì xảy ra nếu bỏ lỡ một liều?

- Dùng liều đó ngay khi nhớ ra.
- Bỏ qua liều đã quên nếu gần đến giờ cho liều theo lịch tiếp theo của bạn. Không dùng thêm thuốc để bù liều.

Điều gì xảy ra nếu quá liều?

- Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Những lưu ý trước khi dùng thuốc Femara 2,5mg Letrozole

Bạn không nên sử dụng thuốc Femara nếu bạn bị dị ứng với letrozole hoặc nếu bạn có:

- Nếu bạn chưa hoàn toàn trải qua thời kỳ mãn kinh
- Bạn có thai.

Không sử dụng thuốc letrozole nếu bạn đang mang thai. Sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả nếu bạn không mãn kinh. Tiếp tục sử dụng biện pháp tránh thai trong ít nhất 3 tuần sau liều thuốc Femara cuối cùng của bạn. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mang thai.

Liên Hệ

Để đảm bảo thuốc này an toàn cho bạn, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có:

- Bệnh gan (đặc biệt là xơ gan)
- Loãng xương, loãng xương (mật độ xương thấp)
- Cholesterol cao
- Nếu bạn cũng dùng tamoxifen.

Bạn không nên cho con bú trong khi bạn đang sử dụng letrozole và trong ít nhất 3 tuần sau liều cuối cùng của bạn.

Liều dùng của thuốc Femara 2,5mg letrozole

- Liều khuyến cáo của thuốc Femara là một viên thuốc 2,5mg dùng mỗi ngày một lần, không liên quan đến bữa ăn. Cho bác sĩ của bạn tất cả các loại thuốc theo toa và thuốc không kê toa và các chất bổ sung mà bạn sử dụng.
- Thuốc Femara không được sử dụng trong khi mang thai. Thuốc có thể gây hại cho thai nhi.
- Thuốc Femara được sử dụng chủ yếu ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Nếu gần đây bạn đã trải qua thời kỳ mãn kinh, hãy thảo luận về việc kiểm soát sinh sản với bác sĩ của bạn.
- Không sử dụng biện pháp ngừa thai có chứa estrogen. Người ta không biết liệu thuốc có đi vào sữa mẹ và có thể gây hại cho trẻ bú mẹ hay không. Cho con bú trong khi sử dụng thuốc này không được khuyến cáo.

Chỉ định điều trị thuốc Femara 2,5mg letrozole

- Điều trị hỗ trợ cho phụ nữ mãn kinh bị ung thư vú xâm lấn dương tính sớm.
- Điều trị hỗ trợ kéo dài ung thư vú xâm lấn phụ thuộc hormone ở phụ nữ mãn kinh đã điều trị tamoxifen tiêu chuẩn trước đó trong 5 năm.
- Xử lý đầu tiên-line ở phụ nữ mãn kinh bị kích thích tố – ung thư vú tiến triển phụ thuộc.
- Ung thư vú tiến triển sau khi tái phát hoặc tiến triển bệnh, ở những phụ nữ có tình trạng nội tiết sau mãn kinh tự nhiên hoặc nhân tạo, những người trước đây đã được điều trị bằng thuốc chống oestrogen.
- Điều trị hỗ trợ tân dược cho phụ nữ mãn kinh có thụ thể hoóc môn dương tính, ung thư vú âm tính HER-2 trong đó hóa trị không phù hợp và không được chỉ định phẫu thuật ngay lập tức.

Hiệu quả chưa được chứng minh ở bệnh nhân ung thư vú âm tính với thụ thể hoóc môn.

Chống chỉ định điều trị thuốc Femara 2,5mg letrozole

- Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào
- Tình trạng nội tiết tiền mãn kinh
- Phụ nữ mang thai, cho con bú



Thuốc Femara 2,5mg Letrozole điều trị ung thư vú – Thuoc đặc trị 247 (2)

Những lưu ý đặc biệt và biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thuốc Femara

Đối với tình trạng mãn kinh

- Ở những bệnh nhân có tình trạng mãn kinh không rõ ràng, hormone luteinising (LH), hormone kích thích nang trứng (FSH) hoặc oestradiol nên được đo trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc Femara.
- Chỉ những phụ nữ có tình trạng nội tiết sau mãn kinh mới được nhận thuốc Femara.

Đối với suy thận

- Thuốc Femara đã không được điều tra ở một số lượng bệnh nhân đủ với độ thanh thải creatinin thấp hơn 10 ml/phút. Nguy cơ lợi ích tiềm năng cho những bệnh nhân như vậy nên được xem xét cẩn thận trước khi dùng thuốc Femara.

Đối với suy gan

- Ở những bệnh nhân bị suy gan nặng (Child-Pugh C), phơi nhiễm toàn thân và thời gian bán hủy ở giai đoạn cuối xấp xỉ gấp đôi so với những người tình nguyện khỏe mạnh. Do đó, những bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ.

Hiệu ứng xương

- Thuốc Femara là một chất làm giảm estrogen mạnh. Phụ nữ có tiền sử loãng xương hoặc gãy xương, hoặc có nguy cơ mắc bệnh loãng xương, nên đánh giá chính thức mật độ xương trước khi bắt đầu điều trị hỗ trợ và mở rộng và theo dõi trong và sau khi điều trị bằng letrozole.
- Điều trị hoặc điều trị dự phòng loãng xương nên được bắt đầu khi thích hợp và được theo dõi cẩn thận. Trong phần hỗ trợ, một lịch trình điều trị tuần tự (letrozole 2 năm sau tamoxifen 3 năm) cũng có thể được xem xét tùy thuộc vào hồ sơ an toàn của bệnh nhân.

Thận trọng trước khi sử dụng thuốc Femara

- Trước khi bắt đầu điều trị thuốc Femara, hãy đảm bảo bạn nói với bác sĩ về bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn đang dùng (bao gồm thuốc kê đơn, không kê đơn, vitamin, thuốc thảo dược, v.v.).
- Thông báo cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đang mang thai hoặc có thể mang thai trước khi bắt đầu điều trị này.
- Thuốc Femara được chỉ định cho phụ nữ sau mãn kinh. Đừng thụ thai một đứa trẻ (có thai) trong khi dùng thuốc Femara. Các biện pháp tránh thai bằng rào cản, như bao cao su, được khuyến nghị. Thảo luận với bác sĩ khi bạn có thể mang thai một cách an toàn hoặc thụ thai sau khi điều trị.
- Không cho con bú trong khi dùng thuốc Femara.

Mẹo tự chăm sóc khi sử dụng thuốc Femara

- Acetaminophen hoặc ibuprofen có thể giúp giảm bớt sự khó chịu từ những cơn đau nhức toàn thân. Tuy nhiên, hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng thuốc.
- Thuốc Femara gây buồn nôn ít. Nhưng nếu bạn bị buồn nôn, hãy dùng thuốc chống buồn nôn theo chỉ định của bác sĩ và ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên. Mút kẹo ngậm và kẹo cao su cũng có thể giúp ích.
- Uống đồ uống có cồn nên được giữ ở mức tối thiểu hoặc tránh hoàn toàn. Bạn nên thảo luận với bác sĩ của bạn.
- Nghỉ ngơi nhiều và duy trì dinh dưỡng tốt.
- Nếu bạn gặp các triệu chứng hoặc tác dụng phụ, hãy chắc chắn thảo luận với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ có thể kê đơn thuốc hoặc đưa ra các đề xuất khác có hiệu quả trong việc quản lý các vấn đề đó.

Liên Hệ

Khi nào cần liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn:

Các triệu chứng sau đây cần được chăm sóc y tế, nhưng không phải là trường hợp khẩn cấp. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

- Triệu chứng của thời kỳ tái phát (chảy máu âm đạo / đốm)

Luôn luôn thông báo cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường.

Tác dụng phụ của thuốc Femara

Những điều quan trọng cần nhớ về tác dụng phụ của Femara:

- Hầu hết mọi người không trải nghiệm tất cả các tác dụng phụ được liệt kê.
- Tác dụng phụ thường được dự đoán về mặt khởi phát và thời gian.
- Tác dụng phụ hầu như luôn hồi phục và sẽ hết sau khi điều trị xong.
- Có nhiều lựa chọn để giúp giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tác dụng phụ.
- Không có mối quan hệ giữa sự hiện diện hoặc mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ và hiệu quả của thuốc.

Tác dụng phụ phổ biến (xảy ra trên 30%):

Liên Hệ

- Nóng bừng
- Cholesterol cao

Tác dụng phụ ít phổ biến hơn (xảy ra ở khoảng 10-29):

- Đau khớp (đau xương khớp)
- Đổ mồ hôi đêm
- Tăng cân
- Buồn nôn

Không phải tất cả các tác dụng phụ được liệt kê ở trên. Một số trường hợp hiếm gặp (xảy ra ở dưới 10% bệnh nhân) không được liệt kê ở đây.

Ảnh hưởng của thuốc Femara đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Phụ nữ có tình trạng tiền mãn kinh hoặc khả năng sinh con

- Thuốc Femara chỉ nên được sử dụng ở những phụ nữ có tình trạng mãn kinh được thiết lập rõ ràng. Vì có báo cáo về việc phụ nữ lấy lại chức năng buồng trứng trong khi điều trị bằng thuốc Femara mặc dù tình trạng hậu mãn kinh rõ ràng khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ cần thảo luận về biện pháp tránh thai đầy đủ khi cần thiết.

Phụ nữ mang thai

- Dựa trên kinh nghiệm của con người trong đó đã có các trường hợp dị tật bẩm sinh riêng lẻ (hợp nhất trong phòng thí nghiệm, cơ quan sinh dục mơ hồ).
- Thuốc Femara có thể gây dị tật bẩm sinh khi dùng trong thai kỳ. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh sản
- Thuốc Femara bị chống chỉ định trong thai kỳ

Liên Hệ

Phụ nữ cho con bú

- Người ta không biết liệu letrozole và các chất chuyển hóa của nó có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Không thể loại trừ nguy cơ cho trẻ sơ sinh.
- Thuốc Femara bị chống chỉ định trong thời gian cho con bú.

Phụ nữ có khả năng sinh sản

- Tác dụng dược lý của letrozole là làm giảm sản xuất estrogen bằng cách ức chế aromatase. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, sự ức chế tổng hợp estrogen dẫn đến tăng phản hồi về mức độ gonadotropin (LH, FSH).
- Tăng nồng độ FSH lần lượt kích thích sự phát triển nang trứng và có thể gây rụng trứng.



Thuốc Femara 2,5mg Letrozole điều trị ung thư vú - Thuốc đặc trị 247 (3)

Liên Hệ

Ảnh hưởng của thuốc Femara đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Thuốc Femara có ảnh hưởng nhỏ đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Vì mệt mỏi và chóng mặt đã được quan sát thấy khi sử dụng thuốc Femara và tình trạng buồn ngủ đã được báo cáo không phổ biến, nên thận trọng khi lái xe hoặc sử dụng máy móc.

Thuốc Femara 2,5mg letrozole mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc femara

<https://thuocdactri247.com/dieu-tri-ung-thu-phoi-di-can-voi-thuoc-iressa/>

» Xem thêm thuốc megace điều trị ung thư vú

<https://thuocdactri247.com/thuoc-megace-160mg-megestrol-dieu-tri-ung-thu-vu/>


Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Femara 2,5mg Letrozole** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

5.0 60 

Like this:

Có liên quan



Thuốc tykerb 250mg lapatinib điều trị ung thư vú
21/05/2019
In "Thuốc điều trị ung thư vú"



Thuốc aromasin 25mg exemestane điều trị ung thư vú
17/07/2017
In "Thuốc điều trị ung thư vú"



Thuốc arimidex 1mg anastrozole điều trị ung thư vú
19/12/2017
In "Thuốc điều trị ung thư vú"

Liên Hệ