


النمر المصري العربي (panthera pardus)



النمور (panthera pardus)

النمور المصرية هي قطة كبيرة نادرة ، إن لم تكن منقرضة ، ومعروفة باسم النمر العربي. السلالات الفرعية التي تحدث في مصر هي

P.p. jarvisi and *P. p. pardus*

هذه القطط هي الأكبر في مصر ، ويبلغ طولها بين ١٧٠ و ٢٩٠ سم ، وذيول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. وزنهم في المدى من ٣٥ إلى ٨٥ كجم ، مع الذكور أكبر وأثقل من الإناث.



النمر المصري هو قطة قوية ، مبرقشة ببقع برتقالي إلى أصفر باهت فوق ، وأبيض أدناه. يتم رصدها في كل مكان على الجسم ، على الرغم من أنها أقل كثافة في أسفل الساقين. البقع في الأماكن العليا من الجسم ، ولا سيما على الظهر. لديهم رؤوس كبيرة وقوية ، القطط لديها ذقون

بيضاء ، وأذان صغيرة إلى حد ما ، مع مؤخر مؤشر باللونين الأسود والأبيض. كما تم رصد الجزء العلوي من الذيل ، بينما يحتوي الجزء السفلي على حلقات داكنة غير مكتملة. صنف سيناء ، jarvisi ، يوصف بأنه أعمق قليلاً ببقع بنية. ومع ذلك ، فإن هذه السلالات غير معروفة فعلياً ، وقد تكون الآن مجموعة معزولة من النمر العربي ، P.p. نمر.

في مصر ، كانت مشاهد هذا الحيوان نادرة للغاية.. تم تسجيل pardus في الصحراء الغربية في وقت متأخر من عام ١٩١٣ ، ولكن في عام ١٩٩٤ ، سمعت حملة استكشافية لمنطقة جبل علبة، نمرًا ليلاً وسجلت مسارات جديدة تم تصويرها في اليوم التالي. وأصبح نمر سيناء نادر للغاية ، وأحدث السجلات التي تم التحقق منها هي من الخمسينات. ومع ذلك ، لا يزال البدو من منطقة جبل سربال وفيران يدعون أنه يمكن العثور على الحيوانات في الجبال بأعداد صغيرة للغاية.

تتراوح هذه القطط من غابة عميقة إلى صحراء قريبة ، ولكن في مصر تم العثور عليها في مناطق جبلية مشجرة بأشجار أكاسيا ، مثل جبل علبة. هم حذرون جدا ومراوغ.

باستخدام السمع والبصر ، عادة ما تكون نشطة فقط في الليل ، وتتغذى على الثدييات الكبيرة والصغيرة ، والطيور ، والزواحف ، والحشرات الكبيرة ، والبيض وأحياناً الماشية. عادةً ما يكونون انفراديًا وأقليميًا ، على الرغم من أنه لا يُعرف شيئاً عن عاداتهم في مصر. وعادة ما تكون فترة الحمل من ٩٠ إلى ١١٢ يوماً ، وتلد من واحد إلى ستة أشبال.