

درمان شقاق با لیزر یا عمل جراحی لیزر فیشر، سریع و قطعی

بیماری شقاق (با فیشر) برخلاف ظاهر کوچک خود بیمار بسیار رنج اوری است، بیماران مبتلا به این بیماری درک می‌کنند که این رخم کوچک تا چه حد دردناک و آزار دهنده است وقتی این رخم یا ترک ایجاد می‌شود، باید به سرعت برای درمان شقاق اقدام کرد، در غیر این صورت تنها در طی چند هفته عمق رخم تا چند برابر افزایش می‌یابد، در این شرایط درد و سوزش به حدی افزایش پیدا می‌کند که گاهی اوقات خوابیدن، نشستن و یا حتی راه رفتن هم برای بیمار غیر ممکن می‌شود.

فهرست عنوانین این مطلب

- درمان شقاق با لیزر
- فیلم عمل شقاق با لیزر
- مزایای جراحی لیزر شقاق با فیشر
- هزینه جراحی شقاق با لیزر
- مراقبت‌های پس از درمان فیشر مجدد
- سایر روش‌های درمان شقاق
- عمل جراحی شقاق
- درمان شقاق با بوتاکس
- درمان خانگی شقاق
- پماد‌ها و دارو
- پیشگیری
- سوالات رایج درمان شقاق

شقاق

ترک و یا رخمی است که در مجدد ایجاد می‌شود. این ترک بسیار دردناک و اغلب با خونریزی همراه است. علت ایجاد این بیماری در افراد مختلف، متفاوت می‌باشد. (فیشر)

اما اکثر بیماران به دلیل اختلالات در اجابت مزاج یعنی [بیوسن](#) و اسهال دچار این بیماری می‌شوند

: بسته به مدت زمانی که یک فرد دچار فیشر شده است، می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد. به عبارتی

- شقاق حاد به حالت یک خط طولی است که کمتر از دوازده هفته از شروع آن گذشته است.
- شقاق مزمن رخم وسیعی است که لبه‌های آن برجسته شده و بیشتر از دوازده هفته از شروع آن گذشته است.

: مهمترین علائم و نشانه‌های این بیماری عبارتند از

- احساس درد هنگام اجابت مزاج
- دیدن خون پس از دفع مدفوع
- خونریزی از ناحیه مجدد
- ایجاد زانده پوستی در ناحیه رخم
- سوزش و خارش مجدد

بیشتر بخوانید : شقاق چیست ؟

توصیه ما این است که این بیماری را جدی بگیرید و به محض اینکه اولین علائم بیماری ظاهر شد، برای درمان **فیشر** اقدام کنید. در ادامه به بررسی بهترین و سریع ترین راه‌های درمان شقاق از جمله لیزر می‌پردازم:

مشاوره آنلاین در واتس‌اپ

جهت مشاوره و یا رزرو نوبت ویزیت به این شماره در واتس‌اپ پیام دهید

۰۹۱۹۷۷۱۵۵۲۷

درمان شقاق با لیزر



در حال حاضر بهترین و قطعی‌ترین روش برای رهایی از بیماری آزار دهنده شفاق، لیزر درمانی است. برای درمان قطعی شفاق با لیزر باید قسمتی از عضله آن قطع شود. زیرا که اسپاسم یا فشار شدید داخل عضله مقدع است که باعث شده تا این عضله ترک خورده و زخم شود. برای رفع این اسپاسم باید قسمتی از عضله که آسیب دیده برش داده شده و جدا شود.

پیشرفت دستگاه های پزشکی موجب شده تا از قدرت لیزر برای برش این ناحیه به جای چاقوی جراحی استفاده کنند. این جایگزینی مزیت های بسیاری هم برای بیماران و هم برای بیماری همراه داشته است، که مهمترین آن جلوگیری از عوارض بیماری مثل عفونت و بی اختیاری در کنترل مدفوع و گاز روده است. **چرا که عضله مقدع به شدت حساس بوده و وارد شدن هر آسیبی با چاقوی جراحی به آن می تواند با بی اختیاری در کنترل همراه شود.**

در برخی از موارد گفته می شود که فیشر در اثر کاهش خون رسانی به ناحیه پشت مقدع ایجاد می شود، چرا که این عارضه در ناحیه ی خلفی مقدع بیشتر بروز می کند.

لیزر در هر دو نوع شفاق قابل استفاده است.

- برای شفاق حاد از لیزر های با توان پایین استفاده می شود.
- برای درمان شفاق پیشرفتی یا مزمن از لیزر های با توان بالا استفاده می شود. با این روش زخم شفاق و زایده پوستی آن با کمترین آسیب و حتی بدون درد یا خونریزی برداشته می شود و عمل اسفنکترونومی انجام می شود.


مشاوره آنلاین

برای مشاوره رایگان با کارشناسان یا تعیین نوبت ویزیت می توانید همین حالا به این شماره واتس‌اپ پیام دهید

09197715527

فیلم عمل شفاق با لیزر

همان طور که در ویدئو زیر نیز مشخص است. اشعه لیزر بدون خونریزی بخش آسیب دیده فیشر را جدا می کند. همچنین لیزر سرپایی با حداقل درد و بدون ایجاد عوارض بعدی بهترین نتیجه را به ارمنان می آورد.



0:00 / 2:27

مزایای جراحی لیزر شفاق یا فیشر

از مزایای استفاده از لیزر در این عمل این است که برخلاف جراحی، هنگام عمل به بافت اطراف صدمه نمی‌زند و فرد دچار بی اختیاری در دفع مدفوع نمی‌شود. چنانچه فرد بیمار دچار سایر بیماری‌های مقعد باشد، به طور هم‌زمان می‌توان آن را درمان کرد. احتمال ابتلا به بیماری‌های ویروسی در این روش به صفر می‌رسد. عمل به صورت سرپایی می‌باشد و فرد پس از استراحت کوتاهی به زندگی طبیعی خود باز می‌گردد. از سایر مزایای این روش عدم نیاز به بیهوشی است. هم چنین نسبت به جراحی باز، پس از عمل درد کمتری احساس می‌شود. از دیگر مزیت‌های این درمان می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:

- درمان سرپایی بدون نیاز به بستری در بیمارستان (قبل و بعد از لیزر)
- انجام لیزر در کمتر از نیم ساعت
- مناسب برای انواع شفاق حاد و مزمد
- درمان بیماری تنها در یک جلسه و بدون احساس درد یا خونریزی
- درمان قطعی بدون نیاز به سایر درمان‌ها
- بدون نیاز به تزریق داروی بیهوشی و تحمل عوارض بعدی آن
- بھبودی سریعتر زخم‌ها، بدون نیاز به طی کردن دوره نقاوت در منزل
- پیشگیری از آسیب دیدن پوست اطراف مقعد
- هزینه مناسب و مورد تایید وزارت بهداشت
- پیشگیری از ایجاد عوارض مثل بی اختیاری و عفونت که در جراحی سنتی شفاق به وفور مشاهده می‌شود
- کنترل درد شدید شفاق با یک جلسه لیزر

به نقل از : www.pristyncare.com

جراحی لیزری (جراحی شفاق با لیزر) نسبت به جراحی باز سنتی موفق تر است. میزان موفقیت آن در جراحی لیزر بیش از ۹۷ درصد است. میزان عود بسیار کم است و بین ۱-۳٪ متغیر است.

Laser surgery is more successful than traditional open surgery. Its success rate of laser surgery is more than 97%. The recurrence rate is very low, ranging from 1-3%.

هزینه جراحی شفاق با لیزر

همان طور که اشاره کردیم، یکی از مزیت های لیزر، هزینه مناسب آن است. با انجام لیزر نه تنها در هزینه ها، بلکه در زمان نیز صرفه جویی می کند، زیرا این درمان فیشر در یک جلسه نیم ساعته انجام شده و بعد از انجام آن هم نیازی به طی کردن دوران نقاوت نیست.

کلینیک نوین تمام سعی خود را نموده تا هزینه جراحی شفاق با لیزر را به حداقل کاهش دهد، تا بیماران دغدغه پرداخت هزینه را نداشته باشند.

هزینه درمان شفاق با لیزر با نوجه به عوامل مختلفی تعیین می شود. این هزینه بسته به نوع بیماری و مدت زمانی که از شروع آن گذشته منفاوت است. شرایط سلامتی، دستمزد پزشک و ناحیه ای که شفاق در آن ایجاد می شود، همگی در تعیین هزینه تاثیر گذار هستند.

تعیین هزینه درمان شفاق

جهت تعیین دقیق هزینه درمان و یا مشورت با کارشناسان می توانید همین حالا تماس بگیرید.

۰۴۷۱۸۸۸۷۱۰۴۷

مراقبت های پس از درمان فیشر مقد

پس از انجام لیزر نیاز به مراقبت های خاص و یا استراحت در منزل نیست. بنابراین شما می توانید از همان روز به محل کار خود بازگردید. اما رعایت نکات زیر به شما کمک می کند، تا دوره نقاوت را به راحتی سپری کرده و بعد از این مجدداً به شفاق مبتلا نشوید.

- **کنترل درد :** پس از درمان فیشر ممکن است تا چند روز درد خفیفی احساس شود. برای کنترل این درد می توانید برای ۳۰ دقیقه در وان بالگن آب گرم پنشینید.
- **درمان بیوست :** نرم نگه داشتن مدفوع و جلوگیری از اسهال مزمن از مهم ترین مسائل بعد از این عمل می باشد. زیرا بیوست می تواند باعث بازگشت مجدد بیماری شده و به مقدع آسیب بزند.
- **دارو ها و مسکن :** باید دقت داشته باشید چنانچه از مسکن برای کاهش درد خود استفاده می کنید، مسکن مصرفي بیوست را در شما تشیید نکند. بنابراین در مصرف مسکن ها زیاده روی نکنید و تنها با مشورت پزشک از مسکن ها استفاده کنید.
- **صرف فیبر :** استفاده از مسهل و یک رژیم غذایی سرشار از فیبر شرایط را برای شما بهتر خواهد کرد. در صورتی که خانم هستید، روزانه حداقل ۲۰ گرم فیبر و اگر آقا هستید روزانه حداقل ۳۵ گرم فیبر مصرف کنید. استفاده فراوان از میوه و غلات و سبزیجات عامل موثری در درمان هرچه زودتر پس از عمل شفاق می باشد.
- **ورزش :** انجام ورزش و فعالیت بدنی در دوره نقاوت و پس از آن، می تواند به جلوگیری از بیوست کمک کند. بهتر است تا بهبودی کامل از انجام ورزش های سنگین نظیر وزنه برداری پرهیز کنید. بهترین ورزش در این دوران پیاده روی است.
- **رعایت بهداشت مقدع :** پرهیز از زور زدن در توالت.
- **اجتناب از طولانی نشستن :**

سایر روش های درمان شفاق

از دیگر روش های درمان این بیماری می توانیم به این موارد اشاره کنیم:

عمل جراحی شفاق

یکی از قدیمی ترین روش های درمان این بیماری است. برای جراحی بسته به نوع شفاق با تبغ جراحی یک برش در عضله ایجاد کرده و یا بخشی از آن را قطع

جبهه شفاق

می کنند، تا از فشار داخل عضله مقدع کاسته شود. عمل جراحی در بیمارستان و تحت بیهوشی کامل انجام می شود. ممکن است برای انجام این جراحی یک شب را در بیمارستان بستری شوید.

جراحی نیاز به مهارت و تجربه دارد، اگر در حین جراحی آسیبی به عضله مقدع وارد شود، این عضله آسیب دیده و احتمال بی اختیاری در کنترل مدفوع و گاز روده وجود دارد.

درمان شفاق با بوتакс

یکی دیگر از روش های سریالی درمان این بیماری، تزریق بوتакс یا سم بوتولینوم است. این سم میتواند موقتا برای ۶ ماه عضله را فلک کرده و به این ترتیب عضله از حالت اسپاسم خارج شده و فرستی برای ترمیم می پابد. درد بیمار نیز به سرعت تسکین می پابد. بوتакс معمولاً برای شفاق های مزمن درمان موقتی بوده و بعد از اینکه اثرات دارو محو شد، مجدد بیماری عود میکند. همچنین بوتакс می تواند باعث بی اختیاری موقتی شود.

روش‌های درمان خانگی، درمان قطعی این بیماری نیستند، اما اگر همراه با سایر روش‌های انجام شود، می‌توانند به افزایش سرعت بهبودی و تاثیرگذاری بیشتر کمک کنند.

- مصرف حداقل ۳۰ گرم فیبر در طول روز از بیوست جلوگیری می‌کند.
- نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در طول روز از بیوست جلوگیری می‌کند.
- نشستن در لگن آب گرم چهت تسکین درد

پماد ها و دارو

مصرف پماد‌ها در بطرف کردن علائم شفاق موثر هستند، اما تاثیری در درمان قطعی این بیماری ندارند. از داروهای مناسب چهت رفع علائم این بیماری می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:

- پماد آنتی فیشر
- هیدروکورتیزون
- پماد گلیسیرین تری نیترات
- لیدوکائین

پیشگیری

از نظر میزان شیوع این بیماری میان مردان و زنان نیز، می‌توان گفت به طور یکسان است، اما به نسبت در افراد بالغ بیشتر مشاهده می‌گردد.

شفاق معدی مانند سایر بیماری‌های معد می‌تواند با روش‌های آسانی تا حدودی کنترل شود. از آنجا که بیماری‌های معد ارتباط مستقیمی با روده و معده دارند، ایجاد ساختار مناسبی برای اجابت مزاج می‌تواند بسیار موثر واقع شود. رعایت سبک زندگی سالم می‌تواند شما را از ابتلا به این بیماری در آمان نگه دارد.

به همین چهت رعایت نکات زیر الزامی است:

- رژیم غذایی سرشار از فیبر (مصرف انواع میوه‌ها، سبزیجات و غلات)
- مصرف مایعات به مقدار لازم (حداقل ۸ لیوان آب در طول روز)
- داشتن تحرک و انجام ورزش‌های سبک مانند پیاده روی (حداقل ۳۰ دقیقه در طول روز)
- دوری از استرس (زیرا می‌تواند شما را از بیوست و اسهال مکرر دور نگه دارد.)
- اجتناب از زور زدن در توالت
- رعایت بهداشت معد
- درمان سریع بیوست و اسهال
- مصرف ملین (با مشورت پزشک و در صورتی که بیوست مزمن شده است.)
- پرهیز از شستشوی معد با شوینده‌های معطر و یا خشک کردن آن با دستمال‌های زبر

بسته به نوع شفاق معدی روش‌های درمان آن نیز متفاوت می‌باشد. در برخی از موارد بیماری را می‌توان به وسیله درمان‌های خانگی برطرف کرد.

اگر به تازگی چار شفاق شده اید و در مرحله حاد آن قرار دارید، با استفاده از رژیم غذایی حاوی مواد غذایی فیردار مانند کلم، کاهو، خیار، میوه جات، خاکشیر، انجیر خشک که آب اندخته شده است و یا داروهایی مانند پسیلیوم، شربت لاکتووز یا شربت منیزیم می‌توان از ابتلا به شفاق مزمن جلوگیری به عمل آورد.

همچنین به مراجعه به پزشک و دریافت یک نسخه‌ی داروبی می‌توان این بیماری را کنترل نمود. نشستن در آب ولرم نیز می‌تواند کمک کند. اما اگر هیچ یک از نسخه‌ها جواب ندهد و چار شفاق (فیشر) مزمن شده اید، باید حتماً با پزشک خود مشورت کرده و بهترین راه درمان فیشر را انتخاب نمایید.