

L'uso ricreativo del Viagra può essere molto pericoloso

L'acquisto di Viagra da una fonte inaffidabile può essere rischioso. I farmaci venduti online possono essere falsi, contaminati o scaduti.

Secondo le dichiarazioni alla stampa, nel 2011 Pfizer Global Security ha esaminato 22 siti Web che sono apparsi nei primi risultati di ricerca per la frase "acquista Viagra". Hanno scoperto che circa l'80 per cento di queste pillole erano contraffatte. Queste false pillole di Viagra contenevano il principio attivo sildenafil, ma solo dal 30% al 50% circa dell'importo pubblicizzato.

"Con Internet, non sai mai cosa stai ricevendo", dice Eisenberg.

È anche importante sapere che il Viagra può causare effetti collaterali, come:

Male alla testa

Mal di stomaco o diarrea

Vertigini

Bruciore di stomaco

Naso che cola o chiuso

Sangue dal naso

risciacquo

Difficoltà a dormire

Dolore muscolare o alla schiena

Intorpidimento o formicolio a mani, braccia, piedi o gambe

La sensibilità alla luce o la vista cambia

Anche l'uso del Viagra può comportare seri rischi se si dispone di una condizione medica di base. Ad esempio, gli uomini con malattie cardiache che assumono farmaci noti come nitrati possono sviluppare una pressione sanguigna pericolosamente bassa se assumono il Viagra.

"Dobbiamo assicurarci che questi uomini siano sani prima di iniziare con i farmaci per la disfunzione erettile", sottolinea Eisenberg.

Un'altra preoccupazione è che alcuni uomini che usano farmaci per la disfunzione erettile li mescolano a scopo ricreativo con altre droghe illecite. Un sondaggio pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behaviour ha rilevato che il 4% degli uomini in età universitaria ha ammesso di usare droghe per disfunzione erettile a scopo ricreativo. La maggior parte di loro ha combinato i farmaci per la disfunzione erettile con altri farmaci e ha partecipato a comportamenti sessuali rischiosi.

Alcuni uomini che non hanno la disfunzione erettile ma usano il Viagra possono anche diventare psicologicamente dipendenti dalla medicina e dipendere da essa per avere un'erezione.

Uso off-label o uso medico non approvato del Viagra

Mentre la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Viagra per il trattamento della disfunzione erettile, i ricercatori stanno esaminando come il farmaco potrebbe giovare ad altre condizioni.

Ad esempio, il Viagra potrebbe anche aiutare:

Ipertensione polmonare Il medicinale di marca Revatio contiene lo stesso principio attivo (sildenafil) del Viagra ed è approvato per aiutare gli adulti con ipertensione polmonare, che è caratterizzata da ipertensione nei polmoni.

Malattia di Raynaud Questa condizione, che provoca il freddo e l'intorpidimento delle dita delle mani e dei piedi, potrebbe essere aiutata dal Viagra.

Cancro alla prostata I ricercatori stanno esaminando se il Viagra potrebbe aiutare questo cancro comune.

Altre condizioni Il Viagra è allo studio come potenziale trattamento per molti altri problemi medici.

A volte, il farmaco viene somministrato "off-label", il che significa che il medico lo prescrive per un uso non approvato.

Ottenere sempre una prescrizione medica da un medico

È pericoloso prendere il Viagra per un'altra condizione senza ottenere una prescrizione.

Dovresti sempre consultare il tuo medico per qualsiasi uso di droghe off-label. Avrai bisogno di discutere i vantaggi e i rischi dell'uso del Viagra off-label.

La linea di fondo sul Viagra per uso ricreativo o off-label

Se pensi di avere una disfunzione erettile, la soluzione migliore è consultare il medico. Il Viagra è un'opzione, ma ce ne sono molte altre.

"Voglio dissuadere le persone dall'uso improprio", afferma Eisenberg. "Dico sempre ai miei pazienti che il mio obiettivo è renderli felici e ci sono molti modi per farlo, alcuni con la medicina e altri senza".

Informa il tuo medico di tutte le tue condizioni di salute, dei medicinali che assumi e dei tuoi sintomi, in modo che possa determinare se il Viagra è giusto per te.

Disfunzione erettile