

Varanus griseus ورل صحراوي



يعيش بأحاء مختلفة في شمال أفريقيا وجنوب آسيا. وقد وصفت ثلاث تحت أنواع منه حتى الآن، هي الورل الرمادي والورل القزويني والورل الهندي. يعد الورل الصحراوي سحلية لاحمة، ويتغذى على العديد من الحيوانات الصغيرة.

عادةً ما تكون ألوان جسد الورل الصحراوي متنوّعة وكثيرة، فتتراوح من البني الفاتح والأصفر إلى الرمادي. يبلغ متوسط طوله نحو متر واحد، إلا أنه قد يصل في بعض الحالات إلى مترين تقريباً. وتقطع جسده في الكثير من الأحيان خطوطاً أفقية غامقة على ظهر وذيله، كما تنتثر على ظهره بعض البقع الصفراء. وأما الصغار فيكون لون جسدهم برتقالياً فاقعاً تقطعه خطوط أيضاً، وربما تختفي هذه الخطوط عند بلوغهم. فتحات المنخر عند الورل الصحراوي تقع عالياً في الوجه، أقرب إلى العينين منها إلى الخطم. يعتمد حجم هذه الزواحف على إمكانية حصولها على الطعام، والوقت من السنة، ومناخ المنطقة، وحالة التكاثر. إلا أن الذكور غالباً ما يكونون أكبر من الإناث، ممّا يجعل التمييز بين الجنسين سهلاً نسبياً من على مسافة بعيدة. يمرُّ الورل البالغ خلال حياته بفترات انسلاخ كثيرة، حيث يطرح جلده الخارجي لإتاحة نموّ جسده أكثر، وتتمُّ هذه العملية بشكل دوريّ ثلاث مرات كل عام، ويأخذ إتمام الواحدة منها بضعة أشهر. جلد الورل متكيفٌ مع بيئة الصحراء، وهو يسمح لهذه الحيوانات بأن تكون سباحات ممتازة، فهي قد تدخل الماء أحياناً للصيد.



التشميس وحجم الحوض: يحتاج الورل الصحراوي الى التشميش لفترات طويلة سواء كان تشميس طبيعي أو صناعي بواسطة تسليط الضوء والحرارة على ركن معين من حوض التربية، مع استخدام الأشعة فوق البنفسجية ويجب أن يكون حجم الحوض ثلاثة أضعاف طول الورل حتى يتحرك بحرية

الغذاء: الورل حيوان لاحم، ومتنوع الغذاء للغاية، فيلتهم الحشرات والقواقع والديدان صغيراً والفئران والزواحف والقوارض والأسماك والبيض يافعاً، يعتبر الورل كابوس أي عش به صغار أو بيض لأي حيوان معروف، شاملاً التمساح، حيث يأكل الورل بيض التمساح وصغاره، وعامة الورل من آكلي الرمم فهو ينظف البيئة من الجيف والحشرات والعقارب والقوارض وأيضاً الأفاعي. يري بعض علماء الحيوان أن الورل في دفاعه عن حياته قد يكون أخطر من تمساح في مثل حجمه.

متوسط عمر سحلية الورل عشرين عاماً، وتبلغ أقصى عمر لها وقد تتجاوزها في الأسر مع توافر الظروف الطيبة المحيطة من حرارة مناسبة وغذاء وماء ومساحة للحركة.