

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/12/0044

LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENZES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Vitamīns A (retinola palmitāts) 80 000 IU

Vitamīns D₃ (holekalciferols) 40 000 IU

Vitamīns E (α-tokoferola acetāts) 20 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts, butilhidroksitoluols, sojas eļļa

Dzeltens, eļļains šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

LV Vitol-140 ir vitamīnu A, D₃ un E kombinācija lietošanai zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem sekojošos gadījumos:

- vitamīnu A, D₃ un E deficīta profilaksei vai ārstēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem;
- stresa izraisītu veselības traucējumu ārstēšanai vai profilaksei, kuru izraisa vakcinācija, saslimšana, transportēšana, paaugstināts mitrums, paaugstināta temperatūra vai strauja temperatūras maiņa;
- lai uzlabotu barības izmantojamību.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ievadot noteiktajās devās, blakusparādības nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vienreizējai intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Liellopiem un zirgiem: 10 ml;

Teļiem un kumeļiem: 5 ml;

Aitām un kazām: 3 ml;

Cūkām: 5-8 ml;

Sivēniem: 1-3 ml;

Suņiem: 1-5 ml;

Kaķiem: 1-2 ml.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā, nedrīkst LV Vitol-140 lietot biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Veicot injekciju, jāievēro vispārpieņemtie aseptikas principi.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī (2 - 8 °C).

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā, nedrīkst LV Vitol-140 lietot biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Jāuzmanās, lai nenotiktu nejauša pašinjicēšana.

Pēc zāļu saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, skarto vietu skalot ar lielu ūdens daudzumu.

Pēc zāļu lietošanas, rūpīgi nomazgāt rokas.

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā:

Lietojot zāles grūsnības pirmajā trimestrī, jāievēro piesardzības pasākumi, jo vitamīnam A var būt teratogēna iedarbība.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Taukos šķīstošos vitamīnus nedrīkst uzņemt pārlietu daudz, jo tie uzkrājas organismā un var izraisīt blakusparādības.

Vitamīna A pārdozēšanas gadījumā var novērot samazinātu barības uzņemšanu, ķermeņa svara samazināšanos, eritrēmu, alopeciju, izmaiņas gļotādās un garo kaulu lūzumu uz ko var norādīt klibums vai izmainīta gaita.

Vitamīna D pārdozēšana var izpausties kā hiperkalcēmija, hipofosfatēmija, osteoporoze, hipoparatiroidisms, hiperkalcitonisms un distrofiskā kalcinoze.

Nelietot lielākās devā kā norādīts.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: brūns 100 ml II tipa stikla flakons, kas noslēgts ar plastmasas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005