

Thuốc avodart điều trị phình đại tuyến tiền liệt

Bởi admin - 20/12/2017



Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị và phòng ngừa phình đại tuyến tiền liệt - Thuốc đặc trị 247

Thuốc **Avodart 0.5mg Dutasteride** điều trị và phòng ngừa phình đại tuyến tiền liệt hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ **Thuốc Đặc Trị 247** ☎️ **0901 771 516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Bạn cần biết giá thuốc **Avodart 0.5mg Dutasteride** bao nhiêu? Bạn chưa biết thuốc **Dutasteride** bán ở đâu? **Thuocdactri247** là địa chỉ chuyên mua bán thuốc **Avodart 0.5mg Dutasteride** tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ... Toàn Quốc.



Nội Dung Bài Viết

1. Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride là gì?
2. Thông tin cơ bản thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride
3. Chỉ định điều trị thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride
4. Chống chỉ định điều trị thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride
5. Cách sử dụng thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride
 - 5.1. Liều dùng và thời gian sử dụng thuốc
 - 5.2. Những lưu ý trước khi dùng thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride
 - 5.3. Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride nên dùng như thế nào?
6. Trường hợp khi dùng thiếu liều thuốc Avodart?
7. Trường hợp khi dùng thuốc Avodart quá liều?
8. Khi dùng thuốc Avodart cần tránh những gì?
9. Tác dụng phụ của thuốc Avodart
 - 9.1. Tác dụng phụ ít nghiêm trọng:
 - 9.2. Tác dụng phụ hiếm hoi:
 - 9.3. Tác dụng phụ ít phổ biến:
10. Khuyến cáo không sử dụng thuốc Avodart trong những trường hợp
11. Những loại thuốc nào khác sẽ ảnh hưởng đến Avodart?
12. Ảnh hưởng của thuốc Avodart đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
13. Ảnh hưởng của thuốc Avodart đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú
 - 13.1. Đối với mang thai
 - 13.2. Đối với cho con bú
 - 13.3. Đối với khả năng sinh sản
14. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để xử lý thuốc
15. Chi tiết dược phẩm
 - 15.1. Thành phần viên thuốc
 - 15.2. Thành phần vỏ thuốc
 - 15.3. Tính không tương thích
 - 15.4. Hạn sử dụng
 - 15.5. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho việc lưu trữ
 - 15.6. Bản chất và nội dung
16. Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?
 - 16.1. Like this:
 - 16.2. Có liên quan



Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride là gì?

- Thuốc Avodart ngăn ngừa sự chuyển đổi testosterone thành dihydrotestosterone (DHT) trong cơ thể. DHT có liên quan đến sự phát triển lành tính tuyến tiền liệt lành tính (BPH).
- Thuốc Avodart được sử dụng để điều trị chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) ở nam giới có tiền liệt tuyến tiền liệt.
- Thuốc Avodart giúp cải thiện lưu lượng nước tiểu và cũng có thể làm giảm nhu cầu của bạn cho phẫu thuật tuyến tiền liệt sau này.

Thông tin cơ bản thuốc **Avodart 0.5mg Dutasteride**

- Tên thương hiệu: **Avodart 0.5mg**
- Thành phần hoạt chất: **Dutasteride**
- Hãng sản xuất: glaxo smithKline
- Hàm lượng: 0.5 mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 30 viên nén

Giá thuốc Avodart : **Bình Luận** bên dưới để biết giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua Fanpage **Thuốc Đặc Trị 247**





Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị và phòng ngừa phình đại tuyến tiền liệt – Thuốc đặc trị 247 (1)

Chỉ định điều trị thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride

- Điều trị các triệu chứng từ trung bình đến nặng của tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH).
- Giảm nguy cơ bí tiểu cấp tính (AUR) và phẫu thuật ở những bệnh nhân có triệu chứng HA trung bình đến nặng.

Chống chỉ định điều trị thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride

- Phụ nữ và trẻ em và thanh thiếu niên.
- Bệnh nhân quá mẫn cảm với dutasteride, các chất ức chế men khử 5-alpha khác, đậu nành, đậu phộng hoặc bất kỳ tá dược nào khác.
- Bệnh nhân suy gan nặng.



Cách sử dụng thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride

Liều dùng và thời gian sử dụng thuốc

- Đối với người lớn sử dụng 0.5 mg dutasteride/ ngày tương đương với 1 viên avodart/ ngày, sử dụng thuốc liên tục trong 6 tháng mới mong thấy được kết quả phù hợp. Thuốc có thể được kết hợp với 4mg tamsulosin để đạt hiệu quả cao nhất
- Đối với trẻ em thì chưa có nghiên cứu rõ ràng cần có sự chỉ định và đồng ý của bác sĩ.

Thuốc được sử dụng trước hoặc sau bữa ăn theo chỉ định của bác sĩ. Các thời điểm uống cùng giờ trong suốt quá trình điều trị với avodart. Nuốt nguyên viên, không nhai hay nghiền nát ra khi uống sẽ làm mất tác dụng của thuốc.

Những lưu ý trước khi dùng thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride



- Sử dụng thuốc Avodart có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm để đảm bảo bạn không có các điều kiện khác sẽ ngăn bạn sử dụng thuốc Avodart một cách an toàn.
- Trước khi dùng thuốc Avodart, hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng bị dị ứng với thuốc này, hoặc với một loại thuốc tương tự gọi là finasteride.
- Thuốc Avodart không bao giờ được thực hiện bởi một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ. Dutasteride có thể được hấp thụ qua da và phụ nữ hoặc trẻ em không được phép sử dụng viên nang thuốc Avodart.
- Thuốc Avodart có thể gây dị tật bẩm sinh nếu phụ nữ tiếp xúc với nó trong thai kỳ. Nếu một phụ nữ vô tình tiếp xúc với thuốc từ một viên nang bị rò rỉ, hãy rửa khu vực này bằng xà phòng và nước ngay lập tức.

Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride nên dùng như thế nào?



- Dùng thuốc Avodart chính xác theo chỉ định của bác sĩ. Không dùng với số lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc lâu hơn so với khuyến cáo. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn.
- Uống thuốc với một ly nước đầy và có thể dùng có hoặc không có thức ăn.
- Không nhai, nghiền nát hoặc mở viên nang thuốc Avodart. Nuốt cả viên nang. Dutasteride có thể gây kích ứng môi, miệng hoặc cổ họng của bạn nếu viên nang bị vỡ hoặc mở ra trước khi bạn nuốt nó.
- Để được hiệu quả tốt nhất, hãy dùng thuốc theo chỉ dẫn, đừng ngừng dùng thuốc Avodart mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.
- Để chắc chắn rằng thuốc Avodart giúp ích cho tình trạng của bạn và không gây ra tác dụng có hại, máu của bạn có thể cần phải được kiểm tra thường xuyên. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) của bạn để kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt.
- Lưu trữ thuốc Avodart ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt. Các viên nang có thể trở nên mềm và rò rỉ, hoặc chúng có thể dính lại với nhau nếu chúng quá nóng.
- Không sử dụng bất kỳ viên nang bị nứt hoặc rò rỉ. Gọi cho dược sĩ của bạn để được hướng dẫn về cách vứt bỏ viên nang thuốc Avodart bị rò rỉ một cách an toàn.

Trường hợp khi dùng thiếu liều thuốc Avodar?

- Dùng liều đó ngay khi nhớ ra.
- Bỏ qua liều đã quên nếu gần đến giờ cho liều theo lịch tiếp theo của bạn. Không dùng thêm thuốc để bù liều.



Trường hợp khi dùng thuốc Avodart quá liều?

- Trong các nghiên cứu tình nguyện của thuốc Avodart, liều dutasteride hàng ngày lên tới 40mg / ngày (gấp 80 lần liều điều trị) đã được dùng trong 7 ngày mà không cần lo ngại về an toàn.
- Trong các nghiên cứu lâm sàng, liều 5 mg mỗi ngày đã được sử dụng cho các đối tượng trong 6 tháng mà không có tác dụng phụ bổ sung nào đối với những người được thấy ở liều điều trị 0,5mg.

Khi dùng thuốc Avodart cần tránh những gì?

- Không hiến máu trong khi dùng thuốc Avodart và trong ít nhất 6 tháng sau khi điều trị kết thúc.
- Thuốc Avodart có thể tồn tại trong máu và có thể gây dị tật bẩm sinh nếu phụ nữ mang thai được truyền máu có chứa thuốc Avodart.

Tác dụng phụ của thuốc Avodart

Đến cơ sở y tế khẩn cấp nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào của một phản ứng dị ứng với Avodart: phát ban, khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi, hoặc họng.

Tác dụng phụ ít nghiêm trọng:

- Giảm ham muốn tình dục
- Sự bất lực (gặp rắc rối hoặc giữ một sự cương cứng)
- Đau ngực hoặc mở rộng
- Giảm lượng tinh dịch được thả ra trong quá trình quan hệ tình dục

Tác dụng phụ hiếm hoi:



- Giãn tĩnh mạch cổ
- Nhịp tim không đều
- Tăng cân, ho khò khè
- Thở không đều, khó thở
- Đau ngực hoặc khó chịu
- Sưng mắt, ngón tay, bàn chân hoặc chân dưới

Tác dụng phụ ít phổ biến:

- Xuất tinh bất thường, bất lực
- Giảm hứng thú trong quan hệ tình dục
- Giảm hiệu suất tình dục hoặc ham muốn
- Không có khả năng có hoặc giữ cương cứng
- Mất khả năng tình dục, ham muốn, lái xe hoặc hiệu suất



Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị và phòng ngừa phình đại tuyến tiền liệt – Thuốc đặc trị 247 (2)



Khuyến cáo không sử dụng thuốc Avodart trong những trường hợp

- Không dùng cho bệnh nhân bị dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không sử dụng hoặc cân nhắc sử dụng cho bệnh nhân đã và đang bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc bệnh về gan.
- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, hạn chế sử dụng cho trẻ nhỏ (có chỉ định của bác sĩ).
- Không đi hiến máu khi đang sử dụng thuốc dutasteride, phải ngừng sử dụng thuốc trước đó 6 tháng mới đảm bảo an toàn để hiến máu.
- Không sử dụng rượu bia khi sử dụng thuốc, vì sẽ gây ra những tương tác với thuốc gây tác dụng phụ.

Những loại thuốc nào khác sẽ ảnh hưởng đến Avodart?

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc khác mà bạn sử dụng, đặc biệt là



- Conivaptan (Vaprisol), imatinib (Gleevec);
- Isoniazid (điều trị bệnh lao);
- Kháng sinh như clarithromycin (Biaxin), erythromycin (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole), hoặc telitromycin (Ketek);
- Thuốc chống nấm như itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), miconazole (Oravig), hoặc voriconazole (Vfend);
- Thuốc chống trầm cảm như nefazodone;
- Tim hoặc thuốc chống huyết áp như nicardipine (Cardene) hoặc quinidine (Quin-G); hoặc là
- Thuốc HIV / AIDS như atazanavir (Reyataz), delavirdine (Rescriptor), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase), hoặc ritonavir (Norvir, Kaletra).

Danh sách này không hoàn chỉnh và các thuốc khác có thể tương tác với Avodart. Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn sử dụng. Bao gồm các sản phẩm theo toa, không kê toa, vitamin và thảo dược. Đừng bắt đầu một loại thuốc mới mà không nói với bác sĩ của bạn.

Ảnh hưởng của thuốc Avodart đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

- Dựa trên các đặc tính dược lực học của dutasteride, việc điều trị bằng dutasteride sẽ không được dự kiến sẽ can thiệp vào khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

Ảnh hưởng của thuốc Avodart đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú



Thuốc Avodart chống chỉ định sử dụng cho phụ nữ.

Đối với mang thai

- Cũng như 5 chất ức chế alpha reductase khác, dutasteride ức chế sự chuyển đổi testosterone thành dihydrotestosterone và có thể, nếu dùng cho phụ nữ mang thai nhi, ức chế sự phát triển bộ phận sinh dục ngoài của thai nhi.
- Như với tất cả 5 chất ức chế alpha reductase, khi bạn tình của bệnh nhân đang hoặc có khả năng mang thai, bệnh nhân nên tránh tiếp xúc với bạn tình của mình với tinh dịch bằng cách sử dụng bao cao su.
- Để biết thông tin về dữ liệu tiền lâm sàng.

Đối với cho con bú

- Người ta không biết liệu dutasteride được bài tiết qua sữa mẹ.

Đối với khả năng sinh sản

- Dutasteride đã được báo cáo ảnh hưởng đến đặc điểm tinh dịch (giảm số lượng tinh trùng, lượng tinh dịch và khả năng vận động của tinh trùng) ở những người đàn ông khỏe mạnh.
- Khả năng giảm sinh sản của nam giới có thể được loại trừ.

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để xử lý thuốc

- Dutasteride được hấp thụ qua da, do đó phải tránh tiếp xúc với thuốc bị rò rỉ.
- Nếu bị tiếp xúc, khu vực tiếp xúc phải được rửa ngay bằng xà phòng và nước.
- Bất kỳ sản phẩm thuốc hoặc chất thải không sử dụng phải được xử lý theo yêu cầu của địa phương.



Chi tiết dược phẩm

Thành phần viên thuốc

- Mono- và diglyceride của axit capbest / capric
- Butylhydroxytoluene (E321).

Thành phần vỏ thuốc

- Gelatin, glycerol
- Titan dioxide (E171)
- Sắt oxit màu vàng (E172)
- Triglyceride, chuỗi trung bình
- Lecithin (có thể chứa dầu đậu nành).

Tính không tương thích

- Không áp dụng

Hạn sử dụng

- 4 năm

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho việc lưu trữ

- Không lưu trữ trên 30 ° C
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

Bản chất và nội dung

Các vỉ của màng PVC / PVDC / nhôm mờ chứa 10 viên gelatin mềm được đóng gói vào các hộp chứa 10, 30, 50, 60 và 90 viên.



Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.



Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị và phòng ngừa phình đại tuyến tiền liệt – Thuốc đặc trị 247 (3)

Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride mua bán ở đâu và giá bao nhiêu?

Liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516 / 0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thuốc biệt dược tại Tp HCM, Hà Nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ,... Toàn quốc.

» Xem thêm thông tin thuốc Avodart

<https://thuocdactri247.com/thuoc-avodart-dieu-tri-phinh-dai-tuyen-tien-liet>

» Xem thêm thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

<https://thuocdactri247.com/giai-phap-dieu-tri-ung-thu-tuyen-tien-liet-voi-thuoc-casodex/>



[voi-thuoc-casodex/](https://thuocdactri247.com/giai-phap-dieu-tri-ung-thu-tuyen-tien-liet-voi-thuoc-casodex/)

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Avodart 0.5mg Dutasteride** với mục đích chia sẻ kiến thức mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Bài Viết: Thuốc Đặc Trị 247

5.0 77 ★★★★★


Like this:

Loading...

Có liên quan



Thuốc zytiga 250mg abiraterone giá bao nhiêu
25/12/2017
In "Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt"



Thuốc dostinex điều trị vô sinh ở phụ nữ cao prolactin
20/12/2017
In "Thuốc Khác"



Thuốc xtandi 40mg enzalutamide giá bao nhiêu
18/04/2018
In "Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt"

