

Karta informacyjna wizyty

22/07/2019 16:59: BADANIE

OPIS WYWIADU

- Państwo przyjechali z kotem z podejrzeniem FIPu
- Od środy 10 lipca zaczął się epizod z kichaniem i wypływem z nosa, 2 dni później trafił już do lecznicy z gorączką i złym samopoczuciem, dostawał płyny leki p. zapalne, amoksycylinę z kw klawulonowym. W poniedziałek, wtorek, środę po antybiotyku poczuł się znacznie lepiej. Lekki problemy z wypróżnieniem.
- Dostaje Vetomune i Fortiflorę
- Brak apetytu i jest coraz bardziej apatyczny.
- Dzisiaj przed wizytą wokalizował.
- Dotychczas brak duszności, jedynie w sytuacjach stresowych.
- W dotychczasowych badaniach niewielkie ilości płynu w jamie otrzewnej.
- Jutro wizyta u dr Marcińskiego o godzinie 11

OPIS BADANIA

- *waga 2,7kg
- *BCS 2/9
- *temperatura 38,2
- *błony śluzowe: blado-żółte, CRT ok 2s
- *skóra żółtego koloru
- *ww. chłonne badalne niepowiększone
- *osłuchowo brak słyszalnych patologicznych szmerów, lekko stłumione szmery oddechowe nad polami płucnymi
- *tętno pełne, miarowe,
- *brzuch o powiększonym obrysie niebolesny, na USG widoczna niewielka ilość płynu pomiędzy pętlami jelit

Zalecenia:

1. Utrzymujemy podawanie probiotyku i vetomune
2. Dokarmiamy i utrzymujemy kota w ciepłe i spokoju.
3. Metronidazol 2x dziennie na razie dożylnie w dawce 15mg/kg
4. Jutro kontakt w sprawie wyników badań krwi
5. Wizyta u dr Marcińskiego na czczo

Historia wizyt

* ZABIEGI

Wizyta pierwsza

Pobranie krwi

Kroplówka podczas wizyty

Badanie krwi ALAB morfologia

Badanie krwi żelazo Lab Wet

Badanie laboratoryjne 4

Materiały***

🔪 ZASTOSOWANE LEKI

Płyn Ringera 250ml 1 opakowanie

Sposób podania: Iniekcja podskórna

Catosal 10% 2 ml

Metronidazol 0,5% 100ml 1 sztuka

Sposób podania: Dożylnie

Melovem 5mg/ml 0,3 ml

Sposób podania: Iniekcja podskórna

Duphalyte 2 ml

Sposób podania: Dożylnie

👤 Zarejestrował: lek.wet. Mateusz Kopacz