

## 認識糖尿病藥物

|  | 常見副作用               | 注意事項                  |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>口服降血糖藥物</b>   |                     |                       |
| 雙胍類 (Metformin)  | 噁心、嘔吐、腹瀉            | 進餐時服藥可減低副作用           |
| 磺胺尿素劑 (Gliclazide, Glimepiride, Glipizide)                                   | 低血糖、體重增加            | 應在開始進餐時服藥以避免出現血糖過低的情況 |
| $\alpha$ - 葡萄糖甘酶抑制劑 (Acarbose)   | 胃氣、腹瀉               |                       |
| DPP-4 酶抑制劑 (Alogliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin, Vildagliptin) | 頭痛、喉痛               |                       |
| SGLT2 抑制劑 (Empagliflozin, Dapagliflozin)                                     | 排尿次數增加、血尿或尿液混濁、排尿疼痛 |                       |
| 格列酮類 (Pioglitazone)  | 體重增加、水腫             |                       |
| <b>針劑</b>  |                     |                       |
| GLP-1 受體促效劑 (Exenatide, Liraglutide)   | 噁心、嘔吐、腹瀉            |                       |
| 胰島素  | 低血糖、體重增加            | 適用於一、二型糖尿病            |