

تحصين Lasota اللاسوتا للحمام



- عبوات ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ جرعة.
- يخزن بين الدرجة المئوية ٢ - ٨ ° في الظلام.
- يجب غسل وتعقيم الأيدي والمعدات بعد التحصين.
- تحصين الطيور السليمة فقط.
- يجب استخدام العبوة مباشرة بعد فتحها.
- تجنب التعرض لفيروس اللقاح قدر الإمكان.
- معلومات إضافية :
- اللقاح قد يسبب التهاب ملتحمة العين للمستخدم ،فيروسات اللقاح تنتشر بسرعة
- الأولى هي B1 strain وتعطى من عمر يوم إلى أسبوعين. وهو اللقاح الحي
- الثانية هي La Sota strain وهي تعطى للأعمار الأكبر من أسبوعين ويكرر كل شهر أو شهرين كجرعات تنشيطية.
- يعطى عبر ماء الشرب وهذا هو الأسهل (تذاب في الماء لعمر أسبوعين أو أقل) فقط في الماء
- وفي للأعمار الأكبر من أسبوعين،ويمكن إذابته في الماء
- وتحديد كمية الماء يجب السؤال عنها لأنها تختلف من نوع لآخر
- كما يمكن إعطاؤه كقطرة في العين أو الأنف

(بعد إذابة العبوة في المحلول المعقم الخاص بها)
وأحيانا بالرش عبر بخاخات على مجموعات فيلامس جسمها وتستنشق الرذاذ
المحمل بالفيروس .

الجرعات الأولى من الفيروس الحي مهمة جدا لإكساب المناعة ضد المرض
الذي قد يسبب للمربين خسائر فادحة خصوصا عندما تكون هناك أعداد كبيرة
في مساحات ضيقة.

ملحوظة ١

تعطيش الطيور فترة من ساعتين إلى ثلاثة قبل وضع التطعيم أمامهم

ملحوظة ٢

الماء المستخدم للتطعيم يجب أن يكون خاليا من الكلور أو أي معقم آخر
ويفضل إضافة ٨٠ جم من بودرة الحليب خالي الدسم إلى كل ٣٦ لترا من الماء
قبل إذابة التطعيم المخصص للشرب فيه،

وهي تحافظ على الفيروس محمي من عوامل الجو لمدة أطول قليلا

ملحوظة ٣

ومراعاة عدم تعريض الماء المحتوي على التحصين لضوء الشمس المباشر
كما يجب إيقاف إضافة أي مضادات حيوية أو معقمات إلى مياه الشرب قبل
التطعيم بما لا يقل عن ٤٨ ساعة

وعدم استخدامها لمدة ٢٤ ساعة بعد التطعيم،

التحصين فعال جدا بإذن الله -

الجرعة الأولى هي الأهم ثم كررها بعد شهر ثم يكفي تكرارها كل ٣ أو ٤

أشهر بعد ذلك

ملحوظة ٤

يتعين عليك فتح عبوة اللقاح تحت الماء إي أن تضع يدك داخل الماء المعد
للتطعيم

وتفتح الجزء المطاطي من الغطاء تحت الماء أما الجزء المعدني الخارجي فلا
مشكلة من فتحه خارج الماء

ملحوظة ٥

تتخلص من الزائد بعد ساعة إلى ساعتين لأنه يفسد ويصبح غير صالح للتطعيم.