	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 1 de 32
		Versión: Quinta Edición

**03 DE ABRIL DE 2020 QUINTA EDICIÓN**

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA ALERTA SANITARIA POR  
CORONAVIRUS COVID-19 EN ORGANISMOS COLABORADORES  
RESIDENCIALES Y AMBULATORIOS**

**Departamento de Protección de Derechos**

(27 DE MARZO DE 2020 CUARTA EDICIÓN)  
(20 DE MARZO DE 2020 TERCERA EDICIÓN)  
(17 DE MARZO DE 2020 SEGUNDA EDICIÓN)  
(15 DE MARZO DE 2020 PRIMERA EDICIÓN)

## I. INDICE DE CAMBIOS EN VERSIÓN V

Página	Título	Asunto
<b>Portada</b>	Índice de cambios en versión V	Se agrega recuadro de la versión actual Se agrega DEPRODE
<b>11</b>	Distanciamiento físico	Se actualiza la distancia social a 1,5 metros
<b>12</b>	Ingreso NNAJ	Se diferencia de ingreso NNAJ y Visitas extraordinarias.
<b>12</b>	Visitas NNAJ	Se incorpora pauta de Anexo 5
<b>12</b>	Ingreso NNAJ	Se incorpora ducha y cambio de ropa, de NNAJ, indicaciones punto 10
<b>12</b>	Visitas Extraordinarias	Se actualiza la distancia social a 1,5 metros
<b>13</b>	Control de Ingreso trabajadores/as	Se incorpora para aquellos que no usan uniforme, deben llevar ropa de recambio.
<b>15</b>	Indicación de Medidas preventivas en la residencia	Se actualiza el punto a) Informar inmediatamente a la familia de manera clara y permanente.
<b>15</b>	Indicación de Medidas preventivas en la residencia	Se incorpora punto b) Dentro de lo posible, habilitar un espacio diferenciado. Limitar el movimiento del NNAJ en espacios compartidos.
<b>15</b>	Medidas preventivas en Residencia (caso sospechoso)	Se incorpora punto d) Se debe fortalecer en la Residencia, la educación de los NNAJ en higiene personal, prevención básica de infecciones y medidas de control sobre cómo cuidar a quien se encuentre contagiado con COVID-19 en Residencia, de la manera más segura posible y para prevenir la propagación.
<b>19</b>	Aseo en espacio de aislamiento	Se especifica ítem.
<b>20</b>	Indicación de medidas Preventivas	Se incorpora punto referido a adolescentes y jóvenes embarazadas y/o en periodo de lactancia materna.
<b>25</b>	Reportabilidad	Se actualiza paramétrica: "Diagnóstico confirmado de Coronavirus (Por Técnica PCR)"
<b>25-26</b>	Reportabilidad	Se incorpora cuadro de reportabilidad con Familia, Dirección Regional, Tribunal de Familia, en caso confirmado.
<b>31</b>	Anexo N° 5	Se incorpora Anexo N° 5 Pauta Epidemiológica Control de Ingreso de NNAJ

## II. ANTECEDENTES:

El 7 de enero las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus, denominado SARS-coV-2 como el virus causante de la enfermedad denominada COVID-19.

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional" (ESPII).

Desde el inicio de la epidemia, en Chile se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, por lo que, a partir del 8 de febrero de 2020, se decreta "Estado de Alerta Sanitaria" a nivel nacional.

El 3 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirma el primer caso de contagio por COVID-19

El 11 de marzo de 2020 La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como una pandemia global la situación de COVID-19.

Las medidas que se van tomando dependen de la situación y la fase epidemiológica del virus en el país, que se califican en 4 fases:

Fase 1	País sin casos.	Etapa de contención.
Fase 2	País con casos, importados o detectados localmente, con trazabilidad.	
Fase 3	País con clusters de casos en tiempo, lugar o exposición común	Etapa de mitigación: foco en atención clínica.
Fase 4	País con gran brote comunitario de transmisión local .	


*Fuente: Ministerio de Salud, 2020.*

El 14 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud Decreta Fase 3 del COVID-19 en el Estado de Chile.

El 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud Decreta Fase 4 del COVID-19 en el Estado de Chile.

El 19 de marzo el presidente declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional.

### ¿Qué es?

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 4 de 32
		Versión: Quinta Edición

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS.

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

### **¿Cómo se contagia?**

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección.


Existen dos tipos de clasificación de riesgo por contacto que permiten distinguir el tipo de contagio:

- Contacto de alto Riesgo: personas que han estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas, cumpliéndose además las siguientes condiciones: Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de un metro de distancia, haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, vivir o pernoctar en el mismo lugar, haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor a un metro. Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen.
- Contacto de bajo riesgo: Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y que no cumplen los contextos de contacto de alto riesgo, explicados anteriormente.

### **¿Cuáles son los signos y síntomas?**

En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 37,8°C, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. Los síntomas pueden ser clasificados en:

- Síntomas Comunes: Fiebre > 37,8°; tos seca; cansancio; dolor corporal; congestión nasal; rinorrea (secreción nasal); dolor de garganta; diarrea; dificultades para alimentarse; falta de reactividad.
- Síntomas Sugerentes: Dificultad respiratoria; respiración rápida, hundimiento de costillas; quejido al respirar; labios morados (cianosis); enfermedades

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 5 de 32
		Versión: Quinta Edición

subyacentes (diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades inmunodeprimidas).

### **En estos momentos, ¿quiénes pueden enfermar?**

En la fase de pandemia actual, cualquier persona al interior de nuestro país puede ser contagiada, si no toma las medidas preventivas necesarias.

### **¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19?**

No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas.

### **¿Existe tratamiento?**

No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19. Las personas pueden buscar atención médica para aliviar sus síntomas. Dentro de las investigaciones que se han realizado no se recomienda dar ningún tipo de medicamento para el alivio de síntomas, sin indicación médica.

### **¿Cómo se previene esta enfermedad?**


Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos, por lo que se deben adoptar las siguientes medidas de prevención, dentro de la Residencia.

## **III. MEDIDAS PREVENTIVAS**

### **1. Cuarentena:**


Es una medida de prevención que tiene como objetivo la restricción de actividades que se realizan habitualmente fuera de la residencia a fin de evitar el contagio y propagación de la enfermedad. Para cumplir la instrucción presidencial, el Servicio Nacional de Menores implementará las siguientes medidas que tiendan al cuidado de los NNAJ y trabajadores/as de dichos recintos:

- a) Deberá existir estricto control de ingreso a las residencias. Más abajo en el punto de control de ingreso se describen dichas acciones.
- b) Frente al anuncio de suspensión de clases, se tendrá que actuar en conformidad a las indicaciones que se vayan anunciando por el Ministerio de Educación o la


	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 6 de 32
		Versión: Quinta Edición

Municipalidad respectiva, estas ajustadas a la evaluación psicopedagógica de cada caso.

- c) Las Residencias deberán reforzar el diseño y ejecución de sus rutinas generales, resguardando la utilización del tiempo libre y del ocio, asegurando la incorporación del trabajo preventivo del COVID-19. Así también, hacer partícipe a los NNAJ en cuanto al tipo de actividades de su preferencia.
- d) Se debe evitar que los NNAJ salgan de la Residencia, salvo que esto sea efectivamente necesario, como por ejemplo atenciones de salud impostergables. Respecto de las demás horas médicas, se deberán reprogramar, avisando a los servicios de salud, para la continuidad de cuidados médicos y no perder las atenciones de salud.
- e) Para NNAJ que mantienen atenciones de especialidad por condiciones de salud mental, neurología, u otra especialidad que implique un cuadro agudo de salud, deberá acudir a sus horas de atención, o de urgencia de ser necesario, tomando todas las medidas preventivas necesarias para el traslado. Propiciando la continuidad de los cuidados y previniendo la agudización de los cuadros clínicos.
- f) Es importante entregar información actualizada y hacer partícipe a todo/as los NNAJ, en la periodicidad que sea necesaria, respecto del Coronavirus y la situación de la Residencia; para ello se debe utilizar las asambleas y/o encuentros grupales, resguardando las medidas preventivas de distancia e higiene. Lo anterior, en el contexto de sus procesos interventivos, siendo empáticos con los NNAJ explicándoles en forma didáctica y clara, considerando el curso de vida y las características particulares de cada NNAJ, aplicando de ser necesario técnicas de contención ambiental y emocional. Así también, los NNAJ puedan exponer temas de su interés en relación a la temática.
- g) Con respecto a NNAJ que ingresan ya sea por retorno de salidas no autorizadas o nuevas medidas de protección, se requiere realizar previamente el control de ingreso a la Residencia y pasar por la primera barrera sanitaria de ducha y de cambio de ropa, la cual debe ser empacada en una bolsa cerrada para el lavado (ver indicaciones de lavado de ropa en el punto 10). Si presenta síntomas o temperatura sobre 37,8° C (Termómetro digital infrarrojo), se debe activar las acciones descritas en Flujograma 1-2. En caso de que el NNAJ no permita realizar el control de ingreso, deberán ser abordado como caso sospechoso manteniéndose en el espacio de aislamiento, en aislamiento preventivo, evaluando en forma permanente posible sintomatología hasta que acceda al control de ingreso requerido.

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 7 de 32
		Versión: Quinta Edición

- h) Cada NNAJ que retorna de salida no autorizada, reingreso, o nuevo ingreso a la residencia, deberán tomarse todas las medidas preventivas descritas en este documento, es importante mencionar que el TEST COVID-19 no es una condición de ingreso a la residencia.
- i) En caso que, a consecuencia de hechos eventualmente constitutivos de delitos, en contra de niños, niñas o adolescentes, tal como lo indica la Circular N° 05 del año 2019, en el punto 2.5, un NNAJ resultara lesionado o afectado en su salud, y fuere pertinente su atención en un recinto de salud externo, se deberá proceder a su traslado, para el restablecimiento de su estado de salud, sin perjuicio, de que, en razón de la denuncia realizada, se instruya por parte del Fiscal la realización, como diligencia investigativa, de la constatación de lesiones de manera inmediata en los Servicios de Salud o de Urgencia que correspondiere. Dicha constatación debe contar con el respectivo comprobante de atención del Servicio de Salud Pública.
- j) Con respecto a casos de NNAJ que se encuentren en acercamiento familiar, se debe favorecer su máxima permanencia en el domicilio familiar, realizando el monitoreo correspondiente, que asegure la protección del niño, niña, adolescente o joven. Se deberá entregar información a las familias, sobre las medidas y acciones preventivas.
- k) En el caso de los NNAJ que se encuentran hospitalizados, las visitas se realizarán de acuerdo a lo instruido por el dispositivo de salud en que se encuentre, favoreciendo el contacto telefónico u otro medio tecnológico disponible. Además, se debe resguardar la provisión de todos los insumos que requiere el niño, niña o adolescente y que sean solicitados por el dispositivo de salud. Resulta fundamental tomar contacto previamente con la familia o el adulto significativo, para explicar las razones de la medida, en forma empática y sin generar alarmas innecesarias.
- l) En caso de visitas de familiares, se debe procurar priorizar el contacto telefónico u otro medio tecnológico disponible en todas las oportunidades que sean necesarias, de no lograrse ello, se debe priorizar que la visita sea realizada sólo por un adulto que sea el más significativo, evitando el ingreso de personas que estén en la población de riesgo y niños o niñas. Resulta fundamental tomar contacto previamente con la familia o el adulto significativo, para explicar las razones de la medida, en forma empática y sin generar alarmas innecesarias.
- m) Se requiere contar con la identificación de todos los NNAJ que se encuentren en situación compleja de salud preexistente y programar dentro de los planes de intervención todas las atenciones prioritarias que resguarden su integridad. Los NNAJ que tengan una patología crónica, en la medida de lo posible, deberán estar

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 8 de 32
		Versión: Quinta Edición

en un espacio de resguardo dentro de la residencia, lo que permita una mayor vigilancia y cuidado en consideración a su estado de salud. En caso de que el niño, niña, adolescente o joven requiera una atención de salud, se deberá trasladar con mascarilla y con todas las medidas de prevención.

- n) Respecto de las visitas domiciliarias, estas se deberán suspender y se deberá informar a la familia y al Tribunal correspondiente, de esta medida.
- o) En todo ingreso de trabajadores/as sea por retorno de turnos, de reingreso o personal nuevo en la residencia, tener o no el TEST COVID-19 no es una condición de ingreso.
- p) Cordón Sanitario: Corresponde a la prohibición en el ingreso y salida de las personas, con el propósito de evitar la propagación del Virus, en las comunas, territorios y/o regiones que determine la autoridad.

En el caso de traslados de NNAJ que requieran la necesidad de cruzar este cordón sanitario, se debe portar la cedula de identidad de NNAJ y funcionario que acompaña, deberán portar salvoconducto<sup>1</sup> (credencial, contrato u otro documento que certifique ser funcionario del Servicio) junto con su carnet de identidad.

- q) De todo lo anterior, se debe informar periódicamente a los Tribunales competentes y a su referente habitual de Dirección Regional correspondiente, quienes llevarán un registro y monitoreo permanente.

## 2. El lavado de manos:


Es considerado **la medida de prevención más relevante** (gold standard), sin embargo, para ser efectivo, debe durar entre 40 a 60 segundos. Se deben socializar y sensibilizar las indicaciones que da la OMS en estas materias. De acuerdo al siguiente procedimiento establecido por la OMS:

A lo anterior, es importante considerar las siguientes sugerencias:

- Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos están visiblemente limpias, se puede usar un desinfectante como alcohol gel, cubriendo todas las superficies de las manos y frotarlas por unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no

<sup>1</sup> De acuerdo a lo establecido en Instructivo Salvoconducto Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 22 de marzo, en punto III. Autorización permanente para el personal de emergencias.




	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 9 de 32
		Versión: Quinta Edición

soplar). Si las manos se encuentran visiblemente sucias, siempre lavarlas con agua y jabón.

- Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
- El lavado es indispensable antes y después de utilizar elementos de protección personal (guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros).
- Es importante que el personal de la Residencia, se encuentre constantemente educando a los NNAJ, sobre el correcto lavado de manos, acompañando dicho proceso de ser necesario.
- Después de tener contacto con NNAJ o personas con sospechosa o confirmadas.
- Al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Deseche el pañuelo en un basurero cerrado y lavarse las manos.
- Lavarse las manos siempre antes de comer.
- Lavarse las manos siempre después de usar el baño.

# ¿Cómo lavarse las manos?

**⌚ Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos**




Mójese las manos con agua;



Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



Frótese las palmas de las manos entre sí;



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;




Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;




Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Enjuáguese las manos con agua;



Séquese con una toalla desechable;



Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;



Sus manos son seguras.




Organización  
Mundial de la Salud

Seguridad del Paciente

UNA ALIANZA MUNDIAL PARA UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA

SAVE LIVES

Clean Your Hands

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 11 de 32
		Versión: Quinta Edición

### 3. Uso de mascarillas (Anexo 4):

- **Solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas sanas.** El efecto de la mascarilla disminuye si se ensucia o se humedece, por lo que deberá ser reemplazada sin indicación médica.
- En caso de lactantes, el uso de mascarilla de trabajadores/as con sospecha o confirmados, debe ser obligatorio.
- En caso de acudir a un centro de salud los NNAJ que presenten síntomas deberán hacer uso de mascarillas.
- En caso de NNAJ que presenten síntomas deberán usar mascarillas en espacios comunes, especialmente antes de ser trasladados al centro de salud.
- Las mascarillas deberán ser eliminadas en basurero con tapa destinados para este fin.


### 4. Distanciamiento físico:

- Mantener distancia de 1,5 metros con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudos).
- Evitar contacto directo, como besos, abrazos, darse la mano u otro tipo de contacto físico (es importante considerar, que el virus permanece en la ropa aproximadamente 8 horas).
- Distanciamiento físico, no considera distanciamiento social, por lo que es importante considerar, acciones comunicativas a través de teléfono u otro medio tecnológico, disponible las veces que sea necesario.
- En caso de actividades grupales, no incorporen actividades de contacto físico grupales, dichas actividades deberán realizarse en lugares amplios y ventilados.

### 5. Limpieza y desinfección de superficies:

Es importante mencionar, que el virus puede sobrevivir en las superficies hasta 9 días, por lo que se recomienda:

- Mantener las superficies de contacto limpias y desinfectadas, como mesas, manijas de puertas, teléfonos, teclados, juegos de llaves, juguetes, entre otros.
- Ambientes limpios y ventilados.
- Baños, cocinas y basureros, deben ser limpiados como mínimo 2 veces al día, o toda vez que sea necesario. Cabe señalar, que la limpieza y desinfección, debe ser realizada con utensilios y elementos de protección personal (batas, guantes, mascarillas y antiparras) cuando haya casos confirmados.
- Todos los espacios comunes deberán ser aseados diariamente.

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 12 de 32
		Versión: Quinta Edición

## **6. Monitoreo de síntomas:**

- Tomar y registrar temperatura dos veces al día de todos los NNAJ de la Residencia y trabajadores/as del Centro.
- Observar síntomas que podrían evidenciar la presencia de un cuadro respiratorio.
- Poner atención a síntomas y signos de alerta como dificultad para alimentarse, decaimiento, poca reactividad.
- En caso de enfermedades crónicas o de base es importante mantener el suministro de fármacos y monitoreo de síntomas.

## **7. Ingreso de NNAJ:**

Toda persona que ingrese a la Residencia deberá acceder a ser controlado por los trabajadores/as destinados para esta labor en el centro:

- Lavado de manos
- Control de Temperatura
- Aplicación de Pauta Epidemiológica (Anexo 5)
- Ducha y cambio de ropa (ver indicaciones punto 10)

## **8. Ingreso de Visitas Extraordinarias:**


Toda persona que ingrese a la Residencia deberá acceder a ser controlado por los trabajadores/as destinados para esta labor en el centro:

- Lavado de manos
- Control de Temperatura
- Aplicación de Pauta Epidemiológica (Anexo 3)
- Si la persona manifiesta alguno de los criterios de la Pauta, no podrá realizar ingreso a la Residencia.
- Si cumple con el control y realiza ingreso deberá dar cumplimiento a las medidas preventivas establecida dentro del recinto.
- Chaquetas y bolsos deben ser dejados en un lugar destinado para ello.
- Los espacios para visitas deben ser distribuidos con anterioridad asegurando la delimitación de las distancias (1,5 metros).

## **9. Control de ingreso y salidas de trabajadores/as:**

Todo trabajador/a que ingrese a la Residencia deberá acceder a las medidas de control de ingreso implementadas por el centro:

- Lavado de manos
- Control de temperatura al inicio y término de la jornada.

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 13 de 32
		Versión: Quinta Edición

- Para aquellos que usan uniforme, evitar su uso mientras se traslada a su lugar de trabajo o a su hogar.
- Para aquellos que no usan uniforme, deben llevar ropa de recambio.
- Dejar bolsos, carteras, chaquetas u otros accesorios en bolsas o lugares destinados para esto, con la idea de resguardar la propagación de contagio.

#### **10.Lavado de ropa:**

- La ropa debe ser lavada con agua de 60° a 90° C y detergente de ropa, sino es posible disponer de lavadora, se recomienda remojar en agua caliente y jabón en un recipiente grande.
- La ropa debe ser lavada diariamente y tendida al sol, en caso de no contar con secadoras.
- Para la ropa sucia se debe disponer de un recipiente destinado para ello y alejado de NNAJ.

#### **IV. CASO SOSPECHOSO**

De acuerdo a lo establecido por la División de Planificación Sanitaria del Departamento de Epidemiología, MINSAL con fecha 18 de marzo del 2020. Se indica definición de caso sospechoso de COVID-19:

**\*A.-** NNAJ o trabajador/a con enfermedad respiratoria que presente fiebre o al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria; y con historia de viaje o residencia en un territorio que reporta transmisión local 1 de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas.


**B.-** NNAJ o trabajador/a con cualquier enfermedad respiratoria, que haya estado en contacto con un caso en sospecha o confirmado COVID-19, en los 14 días previos al inicio de los síntomas.


**C.-** NNAJ o trabajador/a con infección respiratoria, independiente de la historia de viaje o contacto con un caso confirmado de COVID-19 y que presente fiebre (37,8°C) y al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, mialgias o disnea.

**D.-** NNAJ o trabajador/a con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad respiratoria) y que requieran hospitalización.

De acuerdo a estas indicaciones, fue establecido el siguiente flujograma N°1, que indica las acciones a realizar en caso de contar con un NNAJ con sospecha de COVID-19.

**FLUJOGRAMA N°1 DE ATENCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS COVID-19**




	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 15 de 32
		Versión: Quinta Edición

## 1. Indicación de Medidas preventivas en la residencia

Posterior a efectuar llamado o atención médica que indica que el caso se encuentra sin sintomatología aguda, sin embargo, se encuentra en estado de evaluación o sospecha de contagio, se deberán tomar las siguientes medidas:

- a) Informar inmediatamente a la familia de manera clara y permanente, procurando que la comunicación incorpore la contención para la familia.
- b) Dentro de lo posible, habilitar habitación una diferenciada. Limitar el movimiento del NNAJ en espacios compartidos.
- c) Se deberá llevar a cabo las indicaciones de manejo recomendadas por el Servicio de Salud.
- d) Se debe fortalecer en la Residencia, la educación de los NNAJ en higiene personal, prevención básica de infecciones y medidas de control sobre cómo cuidar a quien se encuentre contagiado con COVID-19 en Residencia, de la manera más segura posible, y para prevenir la propagación de la infección.
- e) Lavado de manos frecuente, de acuerdo a lo sugerido anteriormente.
- f) Uso de mascarillas.
- g) Distanciamiento físico: En este caso evitar que el NNAJ se encuentre en contacto físico, con otros NNAJ de la residencia, especialmente en espacios comunes, por lo que se sugiere adoptar las medidas preventivas descritas en este protocolo.
- h) Limpieza y desinfección de superficies: Se deberán adoptar todas las medidas de limpieza y desinfección de los utensilios personales del NNAJ.
- i) Separar implementos de aseo, higiene y utensilios para la comida, identificando su pertenencia.
- j) Monitoreo de síntomas. En caso de presentar nuevos síntomas o que estos se agudicen, se deberá trasladar a un centro asistencial.
- k) Resguardo de visitas: Evaluación de ser estrictamente necesario el ingreso de visitas y/o familiares del NNAJ, en lo posible enfatizar y fortalecer el contacto vía telefónica u otro medio, que permita comunicación constante.
- l) Lavado de ropa: Sumados a las indicaciones anteriores, en el ítem de medidas de prevención, es necesario separar la ropa sucia (vestir, cama y aseo) del caso

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 16 de 32
		Versión: Quinta Edición

sospechoso, en bolsas plásticas para posteriormente ser lavadas de acuerdo a las medidas antes señaladas.


## **v. CASO CONFIRMADO**

De acuerdo a lo establecido por la División de Planificación Sanitaria del Departamento de Epidemiología, MINSAL con fecha 18 de marzo del 2020. Se indica definición de caso confirmado de COVID-19, corresponde a aquel caso que en la prueba PCR Coronavirus COVID-19 resulto "POSITIVO".

De acuerdo a esta indicación, fue establecido el siguiente flujograma N°2, que indica las acciones a realizar en caso de contar con un NNAJ con caso confirmado de COVID-19.




## FLUJOGRAMA N°2 DE ATENCIÓN DE CASOS CONFIRMADO COVID-19



**\*Nota:** Durante periodo de aislamiento indicado por médico, se deberán adoptar todas las recomendaciones entregadas, considerando el monitoreo de síntomas del NNAJ, en caso de presentar nuevos síntomas como dificultad para alimentarse, dificultad respiratoria rápida, hundimiento de costillas, quejido al respirar, labios morados (cianosis), deberá ser traslado al NNAJ al Servicio de Urgencia más cercano, con las medidas de resguardo correspondiente.

En caso de requerir apoyo en las gestiones con los dispositivos de salud, contactarse con los respectivos Gestores Intersectoriales/Referentes de Salud.

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 18 de 32
		Versión: Quinta Edición

## 1. Indicación de aislamiento en residencia:

Cuando se presente un caso positivo, el que ha sido confirmado por el servicio de urgencia, se **suspenderán todas las visitas** y se debe informar a familiares o adulto significativo/referente, al Tribunal competente y al referente habitual de la Dirección Regional, en un plazo de 24 horas como máximo, tomando los resguardos ya explicados para la restricción de las visitas, especialmente lo relativo a la información a las familias o adulto significativo, la que deberá complementarse con información específica sobre las acciones que se realizarán respecto al niño, niña, adolescente o joven en particular y el compromiso de mantenerlos informados. Así también, mantener un contacto telefónico u otro medio tecnológico permanente entre el NNAJ, su familia o adulto significativo/referente.

El NNAJ con COVID-19 que presenta síntomas leves, requerirá atención en domicilio. Se requiere mantener un enlace de comunicación directa entre la Residencia y el servicio de salud, lo anterior, hasta su recuperación completa.

Se debe fortalecer en la Residencia, la educación de los NNAJ en higiene personal, prevención básica de infecciones y medidas de control sobre cómo cuidar a quien se encuentre contagiado con COVID-19 en Residencia, de la manera más segura posible, y para prevenir la propagación de la infección. Los NNAJ y los trabajadores/as de la Residencia deben recibir apoyo continuo, educación y monitoreo por la autoridad sanitaria correspondiente.

Las recomendaciones para el cuidado de un NNAJ con COVID-19 en el domicilio, entregadas por el Ministerio de Salud a través de su protocolo, son las siguientes:

- *Limite el número de cuidadores del paciente, idealmente asignar una persona que tenga buena salud sin presencia de factores de riesgo, como enfermos crónicos, embarazadas o adultos mayores. Restringir las visitas.*
- *Al no contar con espacios de salud u otro dispositivo sanitario al interior de la residencia, se recomienda habilitar lugares de aislamiento en un espacio que pueda tener las características para ello (ventilación, iluminación natural, alejamiento de espacios comunes, baño cercano, acceso restringido), dichos espacios podrían ser: salas de reuniones, bibliotecas, oficinas, u otros con los que la residencia pudiera contar.*
- *Los miembros de la residencia deben permanecer en una habitación diferente al niño, niña o adolescente, cuidando que, quien realice la atención directa, debe mantener una distancia de al menos dos metros.*

- *Limite el movimiento del paciente y minimice el uso de espacios compartidos. Asegúrese de que los espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño) estén bien ventilados (por ejemplo, mantener las ventanas abiertas).*
- *Se deberán adoptar todas las medidas de cuidado y manejo, del cuadro contagioso, mencionadas anteriormente (en el ítem de prevención y de caso sospechoso), con el objetivo de entregar las atenciones idóneas y oportunas al NNAJ confirmado y prevenir la propagación de contagio dentro del Centro Residencial.*

- **Aseo en espacio de Aislamiento:**

Se deberá instaurar una modalidad de aseo siguiendo las siguientes orientaciones:

Dos veces al día se hará aseo de superficies por arrastre de las superficies de bajo contacto y aseo y desinfección de superficies de alto contacto con desinfectantes habituales autorizados (por ejemplo, hipoclorito de sodio 1.000 ppm) y posterior desinfección del espacio de aislamiento.

El personal de aseo deberá utilizar los mismos elementos de protección personal (ver Anexo N° 4)

Los utensilios y loza que se destine a los espacios de aislamiento debe ser diferenciados, con el fin de impedir mezcla de estos enseres entre los espacios de aislamiento y las zonas de los NNAJ que no se encuentran en esa condición.

En todo caso, el personal que sea destinados a los espacios de aislamiento, en ningún caso deben utilizar loza o utensilios asignados a estos lugares, debiendo en lo posible realizar sus comidas en lugares externos a los espacios de aislamiento.


Utilizar detergente en el lavado de los utensilios después de ser usados.

En los espacios de aislamiento se intencionará que los baños cuenten con toallas de papel, caso contrario, las toallas deben ser individuales.

Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla.

El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua (450 cc de agua y 50 cc de cloro) y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por los/as NNAJ se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60-90 °C con detergente normal y secar bien.

- **Egreso de Espacios de Aislamiento:**

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 20 de 32
		Versión: Quinta Edición

Una vez que se acredite por facultativo pertinente que el NNAJ no presenta síntomas o se encuentra de alta médica, será retornado a su contexto anterior al aislamiento.

## **2. Adolescentes y Jóvenes Embarazadas y/o en periodo de Lactancia Materna:**

**Necesidades higiénicas y sanitarias:** Entendiendo que existen adolescentes y jóvenes al interior de algunas residencias que cursan un embarazo, se debe tener presente que, al igual que con otros virus respiratorios, las embarazadas podrían tener un mayor riesgo de presentar cuadros más severos, por lo que es muy importante enfatizar las medidas de prevención para evitar el contagio<sup>2</sup>. No obstante, hasta el momento, no se ha observado que embarazadas tengan más riesgo de contraer COVID-19 versus la población general.

Todas las adolescentes y jóvenes, deberán continuar con sus cuidados prenatales de rutina, en coordinación con el centro de salud según disposición territorial, y se deberán tomar todas las precauciones para evitar contagios y consultar precozmente si tienen síntomas que hagan sospechar cuadro clínico de COVID-19<sup>3</sup>.

La evidencia que se tiene hasta el momento no determina que el virus puede ser transmitido de la madre a su hijo en el útero durante la gestación (transmisión vertical) ni indica el impacto de la infección materna en la salud del feto<sup>4</sup>.


**Lactancia:** Se recomienda no suspender en caso de sospecha o persona asintomática, pero sí debe ser acompañada con medidas generales como el uso de mascarilla y lavado de manos. En casos positivos, se sabe que el virus no puede transmitirse por medio de la leche materna, pero debido al riesgo de contagio por medio de gotitas respiratorias se recomienda el uso de mascarillas cada vez que la madre atienda a su hijo/a, higiene de manos antes y después de la atención/alimentación y desinfección de superficies con las que la madre tuvo contacto.

En el caso de que la madre tenga sintomatología que no le permita atender ni alimentar a su hijo/a, pero que no requiera hospitalización, deberá un/a trabajador/a designado (educador de trato directo o TENS) dar apoyo con los cuidados necesarios del niño/a y la alimentación, ya sea por medio de leche materna extraída o fórmula.

<sup>2</sup> Center for Disease Control and Prevention (CDC). *Pregnancy & Breastfeeding. Information about Coronavirus Disease 2019 [Internet].* 2020.

<sup>3</sup> UNICEF. *Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know. How to protect yourself and your children.* 2020.

<sup>4</sup> UNICEF. *Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know. How to protect yourself and your children.* 2020

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 21 de 32
		Versión: Quinta Edición

Para la extracción de leche (ya sea por técnica manual o con un extractor) se debe considerar siempre lavado de manos estricto antes y después de la extracción, uso de mascarilla por la madre durante el proceso y el lavado y esterilización casera de extractores y mamaderas.

Se deberá coordinar con el centro de salud correspondiente por territorio, la disponibilidad de retiro de alimentos para esta población, según abastecimiento.

## **VI. Directrices administrativas para la gestión del personal en el cumplimiento de funciones:**

### Atención de trabajador con sintomatología:

En caso que un trabajador presente sintomatología, debe dirigirse al servicio de urgencia más cercano, para dar curso al procedimiento establecido por el Ministerio de Salud. En caso de que sea confirmado y haya estado en contacto con algún NNAJ, se deberá actuar de acuerdo al punto II Caso sospechoso.


El OCA deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pudiendo contratar personal de reemplazo, con cargo al proyecto de emergencia<sup>5</sup>. Para estos efectos, se sugiere contar con nómina de posibles reemplazos.

### Flexibilidad horaria y trabajo en lugar distinto del habitual

En el caso de que en este periodo de pandemia pudieran paralizarse o tener dificultades en el acceso al transporte y/o el desplazamiento desde y hacia los sectores de trabajo y domicilio, se recomienda las siguientes medidas para que cada proyecto pueda asegurar la continuidad del servicio:

- Tomar conocimiento sobre la ubicación de los domicilios de los integrantes del propio equipo de trabajo.
- Identificar las dificultades que las personas del equipo de trabajo pudieran tener en cuanto al uso de transporte y desplazamiento para llegar al trabajo o regresar a sus domicilios.
- Dar las facilidades a las personas que viven en localidades más apartadas para que puedan flexibilizar sus horarios tanto en la llegada como en la salida de las dependencias del servicio.

<sup>5</sup> Se anexa documento: Formulario de Presentación de Proyectos

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 22 de 32
		Versión: Quinta Edición

- Detectar con anticipación los casos críticos, de aquellos trabajadores/as que no pudieran asistir por falta de transporte o por otro tipo de impedimento.

Habiendo detectado los casos críticos que no podrán asistir con normalidad a las dependencias, se deberá reemplazar o tomar las medidas que permitan la continuidad operacional, la cual deberá ser determinada por cada directivo en conjunto con su institución.

Para ello deberán seguir las siguientes acciones:

1. Definir con anticipación los cargos y funciones claves posibles de desarrollar de esta forma.
2. Cada residencia, deberá determinar el mínimo de trabajadores/as que requiere para la atención de niños/as y adolescentes.
3. Definir las herramientas necesarias para la ejecución de las funciones o actividades que podrán ser desarrolladas.
4. Cada residencia, deberá tener actualizado las direcciones y número de contacto de sus trabajadores/as, con el fin de identificar los posibles ausentismos.
5. Se sugiere, en relación a los turnos del personal, evaluar la posibilidad de aumentar los días de turno, a aquellas personas que tengan disponibilidad, con el fin de reducir los traslados y la circulación.

#### **VII. Proyectos especiales de emergencia<sup>6</sup>:**


Para asegurar y facilitar la gestión y la atención en los centros residenciales, durante este período de pandemia, se activarán proyectos especiales de emergencia para gastos que permitan la continuidad operaciones, en el caso de todas aquellas residencias que lo requieran. Para acceder a estos proyectos especiales de emergencia, el organismo colaborador se debe contactar con Natalia Romanini, asesora de Gabinete, al e-mail: [natalia.romanini@sename.cl](mailto:natalia.romanini@sename.cl).

#### **VIII. Cuidado Alternativo Familiar, FAE PRO:**

En el caso de los programas FAE, se requiere dar cumplimiento al cuidado y atención de los NNA que están en acogimiento, dando énfasis al autocuidado, la prevención sanitaria y las rutinas en contextos de cuarentena.

---

<sup>6</sup> Se anexa documento: Formulario de Presentación de Proyectos

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 23 de 32
		Versión: Quinta Edición

En cuanto a las familias, es necesario mantener los acompañamientos técnicos necesarios con todas las familias FAE, así como también con las familias nucleares, teniendo a ambas informadas de todo el proceso, propiciando que aquellos niños/as que tienen visita, puedan continuar en contacto vía telefónica o por otro medio factible.

En relación a las Familias de Acogida extensas, principalmente abuelas y/o adultos que pueden estar en edad de "adulto mayor", es importante considerar que ante una eventual emergencia grave que incluya a los adultos, no se opere como medida principal con la separación de NNA de su familia y/o su institucionalización, sino que existan alternativas familiares, por ello, se sugiere tener en consideración alternativas en la propia familia en caso de requerirse, tales acciones deben efectuarse con antelación, previniendo lo que pudiera ocurrir.


De igual modo, se expone como indispensable que los Programas FAE a nivel nacional, puedan asesorar a las familias en las rutinas diarias con los niños/as, especialmente en rutinas escolares, de esparcimiento y ocio. A su vez, efectuar monitoreo y seguimiento telefónico al estado de salud de los NNA en acogimiento, y de sus respectivas Familias de Acogida (externas y extensas), reportando debidamente a la Dirección Regional, la existencia o no de contagios por COVID-19 o sospechas de este.

Finalmente, y considerando la disposición de territorios en cuarentena obligatoria y/o con restricción de acceso por implementación de cordones sanitarios por parte de la autoridad nacional, los procesos de enlace familiar programados deberán ser informados a los Tribunales de Familia correspondientes, siendo éstos los encargados de evaluar y autorizar –o no– la realización de los mismos, dadas las restricciones territoriales antes señaladas.

## **IX. Programas Ambulatorios:**

En lo relativo a programas ambulatorios, se debe procurar asegurar la continuidad de atención de los niños, niñas y adolescentes, para ello, se ha considerado lo siguiente:

1. Facilitar las atenciones no presenciales, de conformidad a lo señalado en Resolución Exenta N° 862 que se encuentra publicada en SENAINFO, con fecha 13 de marzo de 2020.
2. Se suspenderán las supervisiones presenciales, favoreciendo aquéllas que se hagan en forma remota.
3. En aquellos programas que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, se debe procurar generar y coordinar las acciones que permitan abordar sanitariamente aquellos casos de los cuales tomen conocimiento.

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 24 de 32
		Versión: Quinta Edición

4. En el caso de las OPD en el marco del "Protocolo intersectorial de atención a víctimas de femicidio" los coordinadores OPD deben dar cuenta de un número celular activado las 24 horas del día (incluido sábados y domingos) el cual debe estar en conocimiento de los respectivos coordinadores Uprode para efectos de coordinar y realizar acciones de intervención cuando se tome conocimiento de un hecho de femicidio, Parricidio Frustrado o consumado donde existan niños, niñas o adolescentes víctimas colaterales. Cada Organismo ejecutor debe definir sistemas de turno e informar a la respectiva Dirección Regional. Dichos profesionales harán las coordinaciones necesarias para activar las medidas proteccionales pertinentes. (Proceso se encuentra descrito en las Orientaciones Técnicas OPD vigentes).

Asimismo, en caso de la necesidad de activar el Protocolo OPD para el Abordaje de Situaciones de Connotación Pública que afecten gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes que sean de repercusión mediática, tanto las Direcciones Regionales de SENAME como las propias OPD deberán activar el *Protocolo* recopilar los antecedentes en terreno para tomar contacto con el niño/a y/o adolescente involucrado/a y su familia (o adultos significativos) y/o instituciones participantes del hecho o que puedan aportar información, con la finalidad de conocer el estado de la situación actual. No obstante, lo anterior ante la imposibilidad de tomar contacto presencial, se puede realizar el contacto telefónico a fin de recabar antecedentes, realizando las coordinaciones pertinentes con las Policías y los Tribunales correspondiente a fin de garantizar la protección de los NNA víctimas de vulneración de derechos (Proceso se encuentra descrito en las Orientaciones Técnicas OPD vigentes).

5. Respecto de la Línea de Acción DAM, la Ley N°20.032 establece que se pagará por servicio prestado, entendiéndose por éste a la labor de diagnóstico en el ámbito psicológico, social u otros análogos de apoyo a la función jurisdiccional, que se encuentre definida como tal en las orientaciones técnicas del Servicio, realizado a un niño, niña o adolescente y sus familias.

En este marco, los proyectos DAM deberán realizar los esfuerzos, y a través de los medios que disponga, para dar cumplimiento a lo que el Tribunal de Familia decretó en materia diagnóstica. Por lo que deberán hacer entrega al Tribunal de Familia, del informe con las diligencias que pudieron ser llevadas a cabo en el contexto actual (Por ejemplo, Revisión documental, revisión del registro Históricas de la base de datos institucional Senainfo, Análisis Documental, recopilación de antecedentes de otras fuentes de información que pueden ser relevantes para el caso, entre otros), y que contribuyan a la decisión judicial. Asimismo, y en el contexto del Estado de la



Alerta Sanitaria decretada a nivel nacional, se solicita que al interior del informe pueda señalar los antecedentes de la situación de salud del niño/a y/o adolescente y su familia que, agotando todos los medios disponibles fue posible obtener.

Finalmente, una vez efectuada las acciones señaladas en el párrafo anterior, y en el marco de la situación nacional, se pagará a los proyectos DAM por servicio prestado hasta el tope de las plazas convenidas por mes.

6. En relación a los programas pertenecientes al circuito 24 horas, es necesario puntualizar lo concerniente a los programas PDC y PDE. Al respecto, se espera la realización de un acompañamiento remoto a las intervenciones desarrolladas en los PIU de cada adolescente vigente, ello con el énfasis fundamentalmente, de monitorear la continuidad de los tratamientos farmacológicos (en el caso de los PDC), y de igual modo, apoyándose de los medios digitales disponibles (despejando que el adolescente cuente efectivamente con estos) poder desplegar estrategias que permitan la continuidad de los contenidos, y reforzamientos educativos pertinentes (en el caso de los PDE).
7. Respecto de los trabajadores y trabajadoras, en caso de presentar síntomas, se sugiere que se dirijan al servicio de urgencia más cercano, para dar curso al procedimiento establecido por el Ministerio de Salud. El OCA deberá tomar las medidas necesarias para no afectar el proceso de intervención de los niños, niñas y adolescentes, en la medida de lo posible.


#### **X. Reportabilidad:**

Se deberá registrar en Senainfo diariamente todos los casos confirmados por Salud de COVID-19.

**En "Diagnóstico confirmado de Coronavirus (Por Técnica PCR)"**

Se deberá informar al Tribunal de Familia y a la Dirección Regional (una vez confirmado, y llevar un registro diario de monitoreo de síntomas)

Además, se deberá llevar un registro interno y monitoreo de los casos con sospecha.



**El presente protocolo (quinta versión) se irá actualizando periódicamente por lo que se solicita estar atento a SENAINFO y cualquier otro medio oficial de información del Servicio.**

**El Servicio está desplegando todas las acciones para poder abordar de la mejor forma posible esta contingencia sanitaria, por lo que se agradece la colaboración de todos ustedes.**

**ANEXO N° 1**  
**Evaluación de síntomas Comunes y síntomas Sugerentes.**  
**Protocolo COVID-19**


Nombre del NNAJ: \_\_\_\_\_

Edad: \_\_\_\_\_ Fecha de la Evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre de la Residencia \_\_\_\_\_

Nombre del Evaluador/a: \_\_\_\_\_

Síntomas Comunes		SI	NO
	Fiebre >37,8°C		
	Tos seca		
	Cansancio		
	Dolor Corporal		
	Congestión Nasal		
	Rinorrea (secreción nasal)		
	Dolor de Garganta		
	Diarrea		
	Dificultades para alimentarse		
	Falta de reactividad		
Síntomas Sugerentes		SI	NO
	Dificultad Respiratoria		
	Respiración rápida		
	Hundimiento de costillas		
	Quejido al respirar		
	Labios morados (cianosis)		
	Enfermedades Subyacentes (Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, enfermedades inmunodeprimidas).		

	<b>Protocolo de Actuación Frente a la Alerta Sanitaria Por Coronavirus COVID-19 en Organismos colaboradores, residencias y ambulatorios.</b>	Fecha: 03/04/2020
		Página: 28 de 32
		Versión: Quinta Edición

## ANEXO N° 2

### Medidas Preventivas de Traslado

### Protocolo COVID-19

Si NNAJ presenta algunos de los signos y síntomas sugerentes, considerados en la evaluación del Anexo N° 1, se debe acudir al Servicio de Urgencia más cercano, sea SAPU o Urgencia Hospitalaria.

- El acompañamiento de NNAJ debe ser realizado a través de un medio que involucre el mínimo contacto con otras personas.
- El trabajador/a que acompañe al NNAJ al centro de Salud debe estar en conocimiento de los antecedentes de salud necesarios para la colaboración en la atención idónea del caso.
- Traslado particular – habitual desde la residencia a centro asistencial.
- El NNAJ debe ir con mascarilla.
- El medio de transporte particular que será usado, debe contar con las medidas sanitarias de limpieza de superficie antes y posterior al traslado.
- El/la o trabajador/a que acompañen el traslado a la salida y reingreso de la residencia debe tomar las medidas preventivas correspondientes.

### ANEXO N° 3

## Encuesta Epidemiológica para visitas excepcionales en Residencia Protocolo COVID-19

Nombre Visitante o familiar: \_\_\_\_\_

Familiar de: \_\_\_\_\_

Edad: \_\_\_\_\_ Fecha de la Evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre de la Residencia: \_\_\_\_\_

Nombre de la Institución procedente: \_\_\_\_\_

PREGUNTAS	SI	NO
¿Ha salido del país en los últimos 30 días a lugares de riesgo? (China, Italia, España, Corea, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, etc.).		
¿Ha tenido contacto con personas sospechosa o diagnosticada con COVID-19 o Coronavirus?		
¿Presenta al momento de la visita: tos, temperatura mayor o igual a 37,8° C o dificultad respiratoria?		

\*Si a cualquiera de estas preguntas anteriores la persona contesta que sí, no se le permitirá la entrada a la residencia.

\*Se aplicará este cuestionario todas las veces que asista a la residencia toda persona, inclusive aquella que se haya recuperado del COVID-19, hasta que las autoridades de salud establezcan fin de la emergencia sanitaria.

\*Si presenta signos o síntomas sugerentes se le indicará acudir a un centro asistencial, dentro de lo posible.

## ANEXO N° 4 Secuencia De Instalación De Elementos De Protección Personal (EPP)

### 1.- LAVADO DE MANOS

Se debe realizar SIEMPRE antes de la instalación de EPP con agua y jabón.



### 2.- COLOCARSE PECHERA

Instalación de pechera con mangas individualmente. Realizar ajuste en la parte **posterior**.



### 3.-MASCARILLA

Una vez realizado los pasos 1 y 2, colocar mascarilla.



### 4.-PROTECCIÓN OCULAR

Instalación de protección para ojos, a través de gafas de seguridad (antiparras).



### 5.-GUANTES

Una vez finalizada la instalación de antiparras, deberá colocar los guantes de procedimiento (**sobre los puños de la pechera**).



**Nota:** Antes de comenzar a colocarse los elementos de protección personal, es importante tener el pelo tomado, el cual nunca deberá estar suelto al momento de efectuar la siguiente secuencia. Además, es recomendable el retiro de joyas como anillos, cadenas u otros accesorios.

## Secuencia De Retiro De Elementos De Protección Personal (EPP)

### 1.- RETIRO DE PECHERA Y GUANTES

Desabrochar pechera y retirar, tirándola de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera. Deseche los guantes y pechera de forma segura.



### 2.- LAVADO DE MANOS

Se debe realizar SIEMPRE con agua y jabón, después del retiro de guantes y pechera.



### 3.-RETIRAR PROTECCIÓN OCULAR

Retiro de antiparras hacia adelante. Durante el retiro, Se debe evitar tocar la cara con las manos. Las antiparras una vez retiradas, deberán ser colocadas en un contenedor exclusivo para este fin<sup>7</sup>.




### 4.- LAVADO DE MANOS

Se debe realizar SIEMPRE con agua y jabón, después del retiro de antiparras.



### 5.-RETIRO DE MASCARILLA

Retirar mascarilla desechable y eliminar en contenedor con tapa destinado para este fin. Evitar tocar mascarilla directamente con las manos.



### 6.- LAVADO DE MANOS

Se debe realizar SIEMPRE con agua y jabón, después del retiro de la mascarilla.



<sup>7</sup> Las antiparras y su contenedor, deben ser lavadas con jabón en agua fría o tibia corriendo, NUNCA utilizar agua caliente. La duración mínima del proceso debe ser de 40 segundos.

## ANEXO N° 5 Encuesta Epidemiológica para Control de Ingreso de NNAJ Protocolo COVID-19

### Ficha de Control de Ingreso de NNAJ

#### Información Personal:

Nombre:

Apellidos :

#### Antecedentes de Salud:

¿Tuvo contacto estrecho con persona diagnosticada de Coronavirus COVID-19?

Si

No

¿Ha estado en los últimos 14 días en algún lugar de alto "riesgo"

Si

No

T°C

Tos con dificultad respiratoria: Sí  No

Temperatura mayor o igual a 37,8° C o si presenta alguno de los síntomas antes descritos, el NNAJ deberá ser llevado/a al Servicio de Urgencias

Ingres a la residencia: Sí  No  Si es no, por qué?

Nombre Responsable de llenar la encuesta:

Firma: